

## Nicotine

【TNIC2】 Nicotinell TTS 20<sup>®</sup> 35.0mg/20cm/Patch

ATC Code : N07BA01

【TNIC3】 Nicotinell TTS 30<sup>®</sup> 52.5mg/30cm/Patch

ATC Code : N07BA01

中文名： 克菸貼片 20、克菸貼片 30 《諾華》

適應症： 幫助戒煙。

含量： Nicotinell TTS 30: **21mg**/24 hours;  
Nicotinell TTS 20: **14mg**/24 hours;

藥理分類： **Smoking Cessation Aid**

用法用量： **Note:** Adjustment may be required during initial treatment (move to higher dose if experiencing withdrawal symptoms; lower dose if side effects are experienced).

### Dosage regimens:

- 每日一片貼於皮膚，並持續停留在皮膚上 24 小時。
- 開始治療時之貼片選擇：
  1. 每天抽菸超過 20 支者，建議使用 Nicotinell<sup>®</sup>TTS 30。
  2. 每天抽菸最多 20 支者，建議使用 Nicotinell<sup>®</sup>TTS 20。
- 療程初期使用高劑量(Nicotinell<sup>®</sup>TTS 30 或 Nicotinell<sup>®</sup>TTS 20)。
- 菸癮大者，第 1-4 週使用 Nicotinell TTS 30<sup>®</sup>，第 5-8 週使用 Nicotinell<sup>®</sup>TTS 20，第 9-12 週使用 Nicotinell<sup>®</sup>TTS 10。

不良反應： 皮膚紅斑搔癢、皮膚刺激、頭暈、頭痛、睡眠障礙、流行性感冒樣症狀。

禁忌： 系統性皮膚疾病、不穩定或惡化之狹心症、嚴重心律不整、急性心肌梗塞、近期有突發性腦血管疾病、孕婦與哺育母乳者、對本品成分過敏者。

注意事項：

1. 一旦開始療程就須完全戒菸。
2. 每日一片，貼於皮膚持續 24 小時。
3. 不要剪破或破壞貼布完整性，每次應更換黏貼部位。
4. 若需接受磁共振造影(MRI)，請先移除貼片。
5. 如果使用後發生慢性失眠，可於貼用本藥後 16 小時即將貼片移除。

懷 孕 期： 不應使用。(仿單)

授 乳 期： 不應使用。(仿單)

中毒處理： 若患者出現過量的症狀，即應立即移去貼片。皮膚表面可用水沖洗並擦乾(不可使用肥皂)。移去此貼片之後，皮膚仍繼續釋出 nicotine 達數個小時，可能是因 nicotine 積存於皮膚內。Nicotine 急性中毒的其他治療措施包括呼吸麻痺時進行人工呼吸、保持正常體溫和治療低血壓及心血管虛脫。