

Conjugated Estrogens

【TPRE1】 Premarin® Vaginal Cream 0.625mg/g, 14g/Tube

ATC Code : G03CA57

中文名： 普力馬林陰道乳膏 «美商惠氏»

適應症： 萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。

藥理分類： **Estrogen Derivative.**

用法用量： **Administration:** for intravaginal use.

- Using applicator provided by the manufacturer, insert cream deeply into vagina. Insertion should be as far as possible into the vagina without causing discomfort. Applicator calibrated in 0.5 g increments up to 2 g.
- To clean applicator, remove plunger from barrel. Wash with mild soap and warm water; do not boil or use hot water. Allow to dry thoroughly before putting back together.

Dosage regimen:

Estrogen replacement therapy:

— Vulvar and vaginal atrophy:

Intravaginally, 0.5-2 g vaginal cream/day in cyclic regimen (3 weeks on and 1 week off); reduce or discontinue dose at 3- to 6- month intervals.

給藥說明：

1. 打開軟膏管蓋子。
2. 將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上。
3. 壓擠軟管使軟膏依所需劑量壓入塗藥管內。
4. 將塗藥器從軟膏管嘴上移除。
5. 躺下後膝蓋彎曲，然後再將含有藥膏的塗藥器輕輕插入陰道深部，推動推管將藥膏完全推入陰道內。
6. 使用後的塗藥器可將推管及容器管分開，用少許的肥皂和溫水沖洗。切勿使用熱水清洗。

不良反應： 體重改變、噁心、腹痛、陰道出血異常、乳房疼脹、白帶、下肢腫脹。

注意事項： 盡量每天同一時間服用。

懷 孕 期： 已經懷孕或可能懷孕婦女禁止使用。

授 乳 期： 藥品成分會分泌至乳汁，會影響乳汁品質及分泌量，須謹慎使用。