

Prednisolone Acetate

【TPRED】Prednicone® 1% Oph. Suspension 5mL/Bot

ATC Code : S01BA04

中文名：復眼康眼藥水 1% «溫士頓»

適應症：眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、鞏膜炎、虹彩毛樣體炎等過敏性疾患。

藥理分類：**Corticosteroid, Ophthalmic.**

用法用量：Safety and effectiveness of corticosteroids in children below the age of 2 years has not been established.

Dosage and administration:

1 to 2 drops instilled into the conjunctival sac 2 to 4 times daily.

During the initial 24-48 hours the dosage may be safely increased to **2 drops every hour.**

Care should be taken not to discontinue therapy prematurely.

不良反應：增加眼內壓力、角膜炎、結膜炎、結膜充血。

注意事項：1.使用前須充分搖晃。
2.開封以後 4 週即丟棄不用。

懷 孕 期：動物試驗之報告指出，會增加裂顎之機率。孕婦則無相關之報告。只有在評估使用本品之益處大於對胎兒的危險性時，才可使用本品。

授 乳 期：1.因為 Prednisolone Acetate 會造成哺乳中嬰兒嚴重不良影響，所以應考慮停止哺乳或停藥並應將此藥之嚴重性告知母親。
2.局部使用 Corticosteroids 是否會成全身性吸收後而出現在人乳之報告未知。全身性的吸收 Corticosteroids 會出現在人乳中，嬰兒吸收後會抑制其生長、干擾內生性 Corticosteroids 生成或其它不良影響。

儲 存：儲存於 25°C 以下