

Tacrolimus

【TPRO】Protopic® Oint. 0.03% 10g/Tube

ATC Code : D11AH01

中文名： 普特皮軟膏 0.03% 《禾利行》製造廠--Leo

適應症： 適用於因為潛在危險而不宜使用其他傳統治療、或對其他傳統治療反應不充分、或無法耐受其他傳統治療的中度至重度異位性皮膚炎患者，作為短期及間歇性長期治療。

藥理分類： Calcineurin Inhibitor; Immunosuppressant Agent; Topical Skin Product.

用法用量：

- Apply a thin layer to the affected areas twice daily.
- The ointment should be rubbed in completely and discontinue use when symptoms have cleared.

不良反應： 局部皮膚疼痛、灼熱感、搔癢。

注意事項：

1. 本品適用成人與 2-15 歲孩童；2 歲以下孩童禁用。
2. 使用本品期間應儘量減少或避免暴露於天然或人造日光之下。
3. 任何年齡應避免長期連續使用局部性 calcineurin 抑制劑（因其長期使用之安全性尚未確立），且本劑僅能塗敷於患有異位性皮膚炎之部位。
4. 塗藥後不要用敷料或繃帶覆蓋，亦不要立刻洗澡。
5. Protopic 軟膏應薄薄一層塗抹於患部皮膚。Protopic 軟膏可用於身體任何部位，包括臉部、頸部與彎曲部位，除黏膜部位外。

懷 孕 期： Tacrolimus 可以通過胎盤。只有在對母體潛在益處高於對胎兒潛在風險時才可在懷孕期間使用。

授 乳 期： Tacrolimus 可分泌至人類乳汁中，由於 tacrolimus 可能對吃母乳的嬰兒造成嚴重的不良反應，故應考量藥物對母親的重要性，來決定停止授乳或停藥。