

Fluticasone, Salmeterol

【TSER】Seretide 50 Evohaler® 50/25 mcg/dose, 120Doses/Bot ATC Code : R03AK06

中文名：使肺泰 50 優氟吸入劑 «GSK»

適應症：氣喘(可逆性呼吸道阻塞疾病)之常規治療，包括適合使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之患有氣喘的兒童與成人。

成分：Each dose contains:

Fluticasone Propionate 50 mcg

Salmeterol Xinafoate 25 mcg

用法用量：**Administration:** for inhalation by oral inhalation only.

Dosage regimens:

成人及十二歲以上之青少年：

每日兩次，每次吸二單位劑量(25 mcg salmeterol 及 50 mcg fluticasone propionate)。

四歲以上之兒童：

每日兩次，每次吸二下(25 mcg salmeterol 及 50 mcg fluticasone propionate)。

目前還沒有四歲以下幼兒使用 SERETIDE 的資料。

不良反應：口腔與喉嚨的念珠菌病、肺炎(COPD 病人)、頭痛、聲音嘶啞/發聲障礙、肌肉痙攣、關節痛。

交互作用：

- DESMOPRESSIN: Concurrent use with glucocorticoids may result in increased risk of severe hyponatremia.
- CLARITHROMYCIN, ITRACONAZOLE, RITONAVIR: Concurrent use with salmeterol may result in increased risk of cardiovascular adverse effects.
- BETA-ADRENERGIC BLOCKERS: Concurrent use with SALMETEROL may result in decreased efficacy of salmeterol.

注意事項：

- SERETIDE 並非供緩解急性症狀之用，此種情況必須以作用快速且短效之吸入型支氣管擴張劑 (salbutamol) 來治療。病人隨時必備急性氣喘發作之緩解藥物。
- 不可驟然停止氣喘病人之 SERETIDE 治療，因其可能導致症狀的惡化，並應在醫師監控下減少劑量。
- 患有活動性或不活動性肺結核之病人應謹慎使用 SERETIDE。
- 患甲狀腺毒症之病人應謹慎使用 SERETIDE。

懷孕期：

- 有限的資料。只有當預期對母親的治療效益大於可能對胎兒或嬰兒的危險時，才可在懷孕期間投予此藥。

授乳期：

- 吸入治療劑量之後，血中濃度非常低，因此，在人類乳汁中的濃度可能也很低。
- 目前還沒有在人類乳汁中之濃度的資料。
- 只有在對母親的預期效益高於嬰兒可能面臨之任何風險的情況下，才可考慮於授乳期間使用本藥。

**全民健保藥品給付規定：依「呼吸道疾患吸入製劑給付規定」辦理。