

Simbrinza (Brimonidine, Brinzolamide)

【TSIMB】 Simbrinza® Eye Drops Susp. 5 mL/Bot

ATC Code : S01EC54

中文名： 勝克壓複方點眼液 «Alcon»

適應症： 用於治療曾使用單方治療效果不佳的隅角開放性青光眼或高眼壓成人患者，以降低其眼內壓。

成分： Each g contains:
Brimonidine.....2mg/mL
Brinzolamide.....10mg/mL

藥理分類： **Ophthalmic Agent, Antiglaucoma; Alpha2 Agonist; Carbonic Anhydrase Inhibitor.**

用法用量： Instill 1 drop in affected eye(s) 2 times daily
Safety and effectiveness not established in pediatric(<17 yrs) patients.

不良反應： 味覺失常(苦或異味)、眼充血、眼睛過敏、口乾、視力模糊、疲倦或睡意。

注意事項： 1. 使用前將藥水搖晃均勻。
2. 第 1 次開封後 30 天，請將剩餘藥品丟棄。
3. 點藥期間不要戴隱形眼鏡，給藥 15 分鐘後再重新戴上。
4. 建議使用後用手指壓住鼻側之眼角（鼻淚管），並閉起眼瞼 2 分鐘，可降低全身吸收。這可能會減少全身性副作用並增進局部效果。

禁忌： 1. 對有效成分或任何賦形劑或 sulphonamides 過敏。
2. 接受單胺氧化酶（MAO）抑制劑治療的病人。
3. 使用影響正腎上腺素傳輸之抗抑鬱劑（例如：三環抗抑鬱劑及 mianserin）的病人。
4. 重度腎功能不全病人。
5. 高氯血酸中毒的病人。
6. 新生兒與未滿 2 歲的嬰幼兒。

懷孕期： 不建議孕婦或具有生育能力而未採避孕措施的女性，使用 Simbrinza®點眼液。

授乳期： 正在為嬰兒哺乳的女性，不應使用 Simbrinza®點眼液。尚不知道局部使用的用 Simbrinza®點眼液是否會分泌到人類乳汁中。口服投予的 brimonidine 會分泌到乳汁中，故不能排除對哺乳兒童的風險。