

Tropicamide

【TSINT】 Sintropic® 0.5% Oph. Solution 5mL/Bot

ATC Code : S01FA06

中文名： 露光點眼液 5 毫克/毫升 《杏輝藥品》

適應症： 檢查眼睛時放大瞳孔及麻痺睫狀肌。

藥理分類： **Ophthalmic Agent, Mydriatic.**

用法用量： **Administration:** For topical ophthalmic use only.

NOTE:

- Remove contact lenses prior to instillation.
- To avoid excessive systemic absorption, apply gentle finger pressure to lacrimal sac for 2 to 3 minutes following application.
- Do not touch dropper tip to eyelids or any surface.
- Wash hands following administration.

Dosage regimen:

Mydriasis, Cycloplegic refraction:

1-2 drops, repeated in 5 min.

不良反應： 可能會引起視力模糊、眼痛、淚液增加、眼充血或頭痛等。

注意事項：

1. 勿用於房角狹窄性青光眼(narrow angle glaucoma)，或對本品任何成分過敏的人。
2. 用於驗光(屈光)，一滴或二滴於眼內，5 分鐘後重覆一次。如病人於 20 ~ 30 分鐘內未檢查，可再滴一次以延長散瞳效果。
3. 開封以後 4 週即丟棄不用。
4. 本品含有 benzalkonium chloride 成分，該成分可能對眼睛造成刺激，並可能使軟式隱形眼鏡變色。避免與軟式隱形眼鏡接觸。使用前，必須先取下隱形眼鏡，並於點用後至少 15 分鐘再戴回。
5. 本品可能造成眼壓升高。
6. Tropicamide 點眼液可能會導致嗜睡、視力模糊與對光線敏感(畏光)、應建議病人不宜開車或進行其他有危險性的活動。
7. 他有危險性的活動。
8. 藥品外觀為澄清，無色至微黃色溶液。

懷 孕 期： 不建議懷孕期間使用本品。目前尚無或僅有極少數 tropicamide 使用於懷孕婦女的數據。

授 乳 期： 必須權衡哺乳對嬰兒的益處及治療對婦女的效益，決定是否停止哺乳或停用本品。目前尚不清楚 tropicamide 或其代謝物是否會分泌至母乳中。對於哺乳嬰兒可能產生的風險，目前尚無法排除。

儲 存： 請置於 25°C 以下保存。