

Symbicort Turbuhaler

【TSYM】Symbicort® Turbuhaler® 120Doses/Bot

ATC Code : R03AK07

中文名：吸必擴都保定量粉狀吸入劑 «阿斯特捷利康»

適應症：● 適合使用類固醇及長效 β_2 作用劑合併治療的支氣管氣喘。
● 適用於18歲以上患有慢性阻塞性肺部疾病。

成分：Each dose contains:
Budesonide 160 mcg
Formoterol 4.5 mcg

藥理分類：Beta2-Adrenergic Agonist, Long-Acting; Corticosteroid, Inhalant (Oral).

用法用量：Administration: For oral inhalation only.

Indications and dosage regimens:

氣喘 (Asthma)：

A.緩解療法 (輕度病人)：

成人及青少年 (12 歲以上)：

- 視症狀需要，使用1劑。假使數分鐘後症狀持續存在，可再使用1劑。
- 單次使用吸入劑量不可超過6劑。每日可在短時間內吸入最多12劑。

兒童 (小於12歲)：不建議用於兒童。

B.緩解兼維持療法：

成人及青少年 (12 歲以上)：

- 病人可每天使用 Symbicort 160/4.5 μ g/dose 維持劑量。需要時使用的吸入劑可快速緩解症狀，改善氣喘整體控制情形。建議病人隨身攜帶 Symbicort 160/4.5 μ g/dose 做為症狀緩解藥物，不需要其他緩解症狀的吸入器。
- 視症狀需要，使用1劑。假使數分鐘後症狀持續存在，可再使用1劑。
- 單次使用吸入劑量不可超過6劑。每日可在短時間內吸入最多12劑。
- 維持劑量，每天吸入2劑；可採取日夜各1劑，或者2劑都在日間或夜間使用。部分病人可能適合每天使用2次，每次吸入2劑的維持劑量。

兒童 (小於12歲)：不建議用於兒童。

C.維持療法 (固定劑量)：

成人 (18 歲以上)：

- 可做為每日固定劑量治療，併用其他短效型支氣管擴張劑，以緩解症狀。建議病人隨身攜帶另一種短效型支氣管擴張劑，以緩解症狀。
- 每天2次，每次吸入1-2劑。
- 維持劑量或在氣喘惡化期間使用：每天2次，每次最多吸入4劑。

青少年 (12-17 歲)：每天2次，每次吸入1-2劑。

兒童 (6 歲以上)：每天2次，每次吸入1劑。每日最大劑量：吸入2劑。

慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)：

成人：每天2次，每次吸入2劑。

不良反應：心悸、咽喉部念珠菌感染、咳嗽、聲音嘶啞、頭痛、顫抖。

注意事項：1.為減少口腔咽喉發生念珠菌感染，在每次給藥後以水漱口。
2.糖尿病病患使用本藥時，應加強對其血糖之控制。

- 3.因為所投予之粉末量非常少，在吸入後可能無法嚐知其味。如果依照指示使用，可確信所需的藥物劑量已被吸入。
- 4.在吸入劑量之前，如果誤做了不止一次裝填藥物的步驟，仍然只會吸入一次劑量；然而，劑量指標會隨著裝填的劑量次數而減少。
- 5.當您搖晃吸入器所聽到的聲音並不是藥物產生的，而是乾燥劑所致。
- 6.請定期（每週一次）用乾布擦拭吸嘴外側；**不要**用水或液體清潔吸嘴。

懷 孕 期： 1.目前並無 Symbicort Turbuhaler 或 budesonide 及 formoterol 合併使用於懷孕婦女的臨床經驗。

2.在懷孕期間，除非於評估後治療的益處高於可能的風險，才能使用。需以最低有效劑量之 budesonide 維持氣喘症狀之控制即可。

授 乳 期： 1.除非藥物對母親的預期益處，遠超過其對嬰兒之可能危險，才可給予哺乳婦女使用 Symbicort Turbuhaler。

2.Budesonide 會在乳汁中排出。然而，預期在治療劑量下對嬰兒應無顯著影響。目前尚未確知 formoterol 是否會進入人類乳汁中；在老鼠研究中，母體乳汁中可測出微量之 formoterol。