

Symbicort Rapihaler

【TSYMR】Symbicort® Rapihaler® 160/4.5 mcg/dose 120 Doses/Bot ATC Code : R03AK07

中文名：吸必擴氣化噴霧劑 《阿斯特捷利康》

主成分：Each Dose contains：

Budesonide.....160mcg, Formoterol.....4.5mcg

適應症：●氣喘(Asthma)：適用於適合使用吸入型皮質類固醇及長效 β_2 作用劑(β_2 -agonist)合併治療的氣喘常規治療。
●慢性阻塞性肺部疾病(COPD)：適用於患有中至重度 COPD，頻繁出現症狀及有惡化病史之病人的常規治療。

藥理分類：Beta2-Adrenergic Agonist, Long-Acting; Corticosteroid, Inhalant (Oral).

用法用量：**Administration:** For oral inhalation only.

Indications and dosage regimens:

Asthma:

Adult(≥ 18 yrs): 2~4 Puff BID, Max 4 Puff BID

12~17 yrs: 2 Puff BID

COPD:

Adult(≥ 18 yrs):

2~4 Puff BID, Max 4 Puff BID

Safety and efficacy not established in children < 12 yrs

不良反應：心悸、咽喉部念珠菌感染、咳嗽、聲音嘶啞、頭痛、顫抖。

交互作用：

- Ketoconazole、itraconazole 和 ritonavir：↑ budesonide 血中濃度。
- β -腎上腺素阻斷劑（包括眼藥水）：會減弱或抑制 formoterol 之效果。
- Quinidine、disopyramide、procainamide、phenothiazines、抗組織胺（terfenadine）、單胺氧化酶（MAO）抑制劑及三環類抗憂鬱劑：延長 QTc 間期且增加心室心律不整的風險。
- L-Dopa、L-thyroxine、oxytocin 及酒精：使心臟對 β_2 作用劑之耐受性降低。
- MAO 抑制劑，包括具有相似特性的藥物（例如 furazolidone 及 procarbazine）併用：促使血壓上升。

注意事項：1. Symbicort Rapihaler 並非用於氣喘之起始治療。病人應被告知要隨時攜帶急性緩解之吸入劑。

2. 吸入器使用步驟請詳閱說明書。

3. 為減少口腔咽喉發生念珠菌感染，每次給藥後以水漱口。

4. 第一次使用，將吸入器從防潮箔袋取出，丟棄箔袋。

5. 如果吸入器是新的、或已有一週以上未使用，或曾掉落過，則輕輕搖晃它 5 秒，並直立對空按壓 1 次，之後再輕輕搖晃它 5 秒，並再次對空按壓 1 次。

6. 請定期清理吸入器（至少每週一次）。清潔步驟請詳閱說明書。

懷 孕 期：1. 目前並無 Symbicort Rapihaler® 或 budesonide 及 formoterol 合併使用於懷孕婦女的臨床經驗。

2. 在懷孕期間，除非於評估後治療的益處高於可能的風險，才能使用。需以最低有效劑量之 budesonide 維持氣喘症狀之控制即可。

授 乳 期：除非藥物對母親的預期益處，遠超過其對嬰兒之可能危險，才可給予哺乳婦女使用 Symbicort Rapihaler®。Budesonide 會在乳汁中排出。然而，預期在治療劑量下對嬰兒應無顯著影響。目前尚未確知 formoterol 是否會進入人類乳汁中；在老鼠研究中，母體乳汁中可測出微量之 formoterol。