

Tafluprost

【TTAF】 Taflotan[®]-S Oph. Sol. 0.0015% 0.3 mL/Vial

ATC Code : S01EB05

中文名： 泰福羅坦眼藥水 «Santen»

適應症： 隅角開放性青光眼及高眼壓症。

成分： Each mL contains:

Tafluprost 0.015 mg

藥理分類： Antiglaucoma; Prostaglandin, Ophthalmic.

用法用量： **Ocular Hypertension/Open-angle Glaucoma:**

1 drop applied to affected eye(s) once daily in the evening; MAX 1 drop QD.

Safety and effectiveness not established in pediatric patients.

不良反應： 眼睛刺激、眼睛不適、異物感、疼痛、搔癢、虹膜變色、睫毛變長。

注意事項： 1. 冷藏避光保存。

2. 開封鋁箔包裝後，將藥瓶再放入鋁箔包裝，冷藏存放 6 個月，室溫 1 個月。

3. 使用本藥可能發生虹膜與眼瞼色素沉澱(黑色素增加)或眼周圍的多毛化。

4. 使用前，請先將最初 1-2 滴捨掉(為了除去開封時可能出現的容器碎片)。

5. 需丟棄使用後剩下的藥液(本藥為一次性使用的無菌藥劑)。

懷 孕 期： 只有在潛在效益高於對胎兒的潛在傷害時，方可將 Taflotan[®]-S 用於孕婦。

授 乳 期： 避免哺乳婦使用 Taflotan[®]-S；若需使用，應停用 Taflotan[®]-S 點眼液。

健保規定： 1、單次使用包裝(不含防腐劑)，單眼或雙眼每 4 週限處方支數如下：

I. 每日使用 1 次者，限 30 支(含)以下。

II. 每日使用 2 次者，限 60 支(含)以下。

III. 每日使用 3 次者，限 90(含)支以下。

IV. 每日使用 4 次者，限 120(含)支以下。

2、前列腺素衍生物類：(Prostaglandin analogues)：

(1) 限對 β -blockers 使用效果不佳或不適用之病患使用。宜先以單獨使用為原則。

(2) 療效仍不足時，得併用其他降眼壓用藥(含複方製劑)。