

Trelegy Ellipta (Fluticasone, Umeclidinium, Vilanterol)

【TTRE】Trelegy® Ellipta® Inhalation 92/55/22mcg/Dose

ATC Code : R03AL08

中文名：肺樂喜易利達乾粉吸入劑 «GSK»

適應症：1. 慢性阻塞性肺病維持治療：適用於已接受吸入性皮質類固醇與長效 β_2 作用劑合併治療，或已定期使用兩種吸入型長效支氣管擴張劑合併治療，而仍控制不佳的慢性阻塞性肺病(COPD)病人，以治療氣道阻塞。也適用於降低有惡化病史病人之 COPD 惡化。
2. 氣喘維持治療：適用於併用吸入性長效型 β_2 -腎上腺受體作用劑和吸入性皮質類固醇治療氣喘仍控制不佳的成年病人，做為氣喘維持治療。

主要成分： Each dose contains:

Fluticasone 92mcg, Umeclidinium 55mcg, Vilanterol 22mcg

藥理分類：Corticosteroid, Inhalant (Oral); Anticholinergic Agent, Long-Acting;
Beta₂-Adrenergic Agonist, Long-Acting.

用法用量：Administration:

- Oral inhalation: Dry powder inhaler: For oral inhalation only; administer at the same time each day.
- Discard device 6 weeks after it is removed from the foil tray or when the dose counter reads “0” (whichever comes first).

Indications and Dosage regimens:

Asthma, maintenance:

Adult, 1 dose QD

Chronic obstructive pulmonary disease, maintenance:

Adult, 1 dose QD

Safety and efficacy not established in children < 18 yrs

不良反應：震顫、心悸、頭痛、聲音嘶啞、口咽念珠菌感染、尿滯留。

注意事項：

1. 禁用於有嚴重乳蛋白過敏問題患者。
2. 每天於同一時間使用，每天一次。
3. 尚未準備好吸入藥劑時，請勿將吸口蓋打開，若吸口蓋打開即已上藥。
 - 如果您將吸口蓋打開再關上，但又未吸入藥物，您會浪費掉該劑藥物。該劑浪費掉的藥物會被密封在吸入器內部，但沒辦法再供使用。不可能會意外地一次吸入兩倍或過多的藥物劑量。
4. 吸入之後應用水漱口，且不可吞下，以降低發生口咽念珠菌病的風險。
5. Trelegy® Ellipta® 並不適用於緩解急性支氣管痙攣或治療氣喘。

懷孕期：

1. 目前並無足夠的資料可據以確認是否存有藥物相關風險。
2. 只有在潛在效益超越 β 作用劑干擾子宮收縮作用方面之可能風險的情況下，才可於懷孕後期與分娩期間使用。

授乳期：

1. 目前並無任何關於本品是否會出現於人類的乳汁中、對餵哺母乳之嬰兒的影響或對乳汁生成作用之影響等方面的資訊。
2. 應將餵哺母乳對發育與健康的效益和母親對 Trelegy® Ellipta® 的臨床需求，以及 fluticasone furoate、umeclidinium 或 vilanterol 或母親的基礎疾病對餵哺母乳之嬰兒的任何可能不良影響放在一起考慮。