

## Moxifloxacin

【TVIG】 Vigamox<sup>®</sup> Oph Solution 0.5% 5mL/Bot

ATC Code : S01AE07

中文名： 威爾眸點眼液 «Alcon»

適應症： 外眼部細菌性感染症。

藥理分類： **Antibiotic, Fluoroquinolone; Antibiotic, Ophthalmic.**

用法用量： **Administration:** For topical ophthalmic use only.

### **Dosage regimens:**

1 drop into affected eye(s) 3 times/day for 7 days.

不良反應： 結膜炎、視覺敏銳度降低、眼睛乾澀、角膜炎、眼部不適、眼部充血、眼部疼痛、眼部搔癢、結膜下出血及流淚。

注意事項： 1.對 moxifloxacin 或其他 quinolone 類藥品或本品任何成分過敏者禁止使用。  
2.若發生感染細菌性結膜炎的症狀時，不要配戴隱形眼鏡。  
3.若有皮疹或過敏反應時,請立即停用並就醫。  
4.開瓶 4 週後請勿繼續使用。  
5.Vigamox<sup>®</sup>點眼液用於一歲以下嬰兒的安全性及效果尚未確立。儘管口服部份 quinolone 類藥品之後可能造成未成熟動物的關節病變，但無任何證據顯示眼用投予 Vigamox<sup>®</sup>點眼液對承重關節有任何影響。

懷 孕 期： 由於用於懷孕婦女並無適當的對照研究，只有在潛在效益高於對胎兒的潛在傷害時，方可將 Vigamox<sup>®</sup>點眼液用於懷孕婦女。

授 乳 期： Vigamox<sup>®</sup>點眼液用於哺乳婦女應謹慎使用。雖然可以假設 moxifloxacin 會分泌至人類乳汁中，但是並無法在人類乳汁中偵測出 moxifloxacin。

儲 存： 本劑應貯存於 2°C 至 25°C。