

Diclofenac Sodium

【TVOL】Voltron Supp. (Voren Supp[®]) 12.5mg/Supp.

ATC Code : M01AB05

中文名：非炎栓劑 «永信»

適應症：下列疾患之鎮痛、消炎：慢性風濕性關節炎、變形性關節炎、後陣痛、急性上呼吸道炎。手術後之鎮痛、消炎。

藥理分類：**Analgesic, Nonopioid; Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID).**

用法用量：**Administration: Rectal.**

Remove suppository from plastic packet and insert into rectum as far as possible.

Dosage regimens:

Adult: 75-100mg daily, divided in BID-TID.

Children: 0.5-2 mg/kg/dose BID-TID

9-11 yrs: 1-2 supp. 1-2 times daily

6-8 yrs: 1 supp. 1-2 times daily

3-5 yrs: 0.5-1 supp. 1-2 times daily

< 3 yrs: 0.5 supp. 1-2 times daily

不良反應：直腸黏膜刺激、腹部不適、噁心、胃絞痛、軟便或腹瀉。

交互作用：

1. **Urokinase**: ↑ the anticoagulant effect of Urokinase.
2. **Apixaban**, Dabigatran, Edoxaban, Rivaroxaban, Aspirin : ↑ the risk of bleeding.
3. **Enoxaparin**, Heparin: ↑ the anticoagulant effect of Enoxaparin.
4. **Lithium**: ↑ the serum concentration of Lithium.
5. **Loop Diuretics**: ↓ the diuretic effect of Loop Diuretics. Loop Diuretics may ↑ the nephrotoxic effect of NSAIDs.
6. **Methotrexate**: ↑ the serum concentration of Methotrexate.
7. **SSRIs**: ↑ the antiplatelet effect of NSAIDs (Nonselective). NSAIDs (Nonselective) ↓ the therapeutic effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors.
8. **Tenofovir**: ↑ the nephrotoxic effect of Tenofovir Products.
9. **Vaccines**: ↓ the therapeutic effect of Vaccines. Only applies to prophylactic use of NSAIDs before or during vaccine administration.
10. **Warfarin**: ↑ the anticoagulant effect of Warfarin.

注意事項：

1. 新生兒及乳兒的體溫調節機構尚未完全發育，故應於體溫過度上升時方投用本劑，以避免引起體溫過度下降。
2. 本劑禁用於重症之血液疾患、肝或腎障礙及直腸炎、直腸出血、痔瘡、Aspirin 氣喘之患者。
3. 一天不建議超過 3 次(避免過度刺激肛門內腸黏膜造成腹瀉)。
4. 如有腹瀉症狀，請勿使用。

懷 孕 期：懷孕期間使用本品的安全性尚未確立。懷孕第三期禁止使用本品(因可能引起主動脈導管的早期癒合)。

授 乳 期：用於授乳婦時，對嬰兒的安全性尚未確立。唯有效益高於可能風險時才使用。

儲 存：請於 25°C 以下陰涼處保存。