

Diclofenac Sodium

【TVOR4】Voren-G® 10mg/g, 40g/Tube

ATC Code : M02AA15

中文名：非炎凝膠 «永信»

適應症：短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。

藥理分類：Analgesic, Nonopioid; Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID).

用法用量：Administration:

- apply to clean, dry, intact skin; do not apply to open wounds, eyes, or mucous membranes.
- Do not cover with occlusive dressings or apply heat, sunscreens, cosmetics, lotions, moisturizers, insect repellents, or other topical medications to affected area.

Indications and Dosage regimens:

Apply 2-4g TID~QID to affected area and rub into the skin gently.

不良反應：皮膚搔癢、灼熱感、局部發紅、過敏性皮膚炎等。

- 注意事項：
- 1.每日使用 3-4 次。
 - 2.使用時，依據疼痛部位的面積大小來決定使用量，每次使用量約 2-4 克，塗抹面積建議在 2 公分 x2 公分(約一個五元硬幣之寬度)至 5 公分 x 5 公分(約兩個十元硬幣之寬度)。
 - 3.在疼痛部位塗抹本藥品後輕輕揉入皮膚。
 - 4.如用藥後發生喉痛、口腔/黏膜潰爛、皮疹等症狀,應立即停藥並就醫。

懷 孕 期：懷孕期間使用本品的安全性尚未確立。懷孕第三期禁止使用本品(因可能引起主動脈導管的早期癒合)。

授 乳 期：本品用於授乳婦時，其對嬰兒的安全性尚未確立。

備 註：衛署藥字第 0950332410 號文公告：含 Diclofenac 成分皮膚外用劑型之藥品類別統一為「醫師藥師藥劑生指示藥品」。