

Podophyllotoxin

【TWART】Wart Del Cream 0.15%® 5g/Tube

ATC Code : D06BB04

中文名： 汰疣凝乳膏 0.15%《中生生技》

適應症： 生殖器疣（包括外生殖器及肛門附近的疣）。

藥理分類： Keratolytic Agent; Topical Skin Product.

用法用量： **Genital and perianal warts:** Topical:

Apply twice daily (morning and evening) for 3 consecutive days, then withhold use for 4 consecutive days;
this cycle may be repeated up to 4 times until there is no visible wart tissue;
maximum dose: 0.5 g daily (or $\leq 10 \text{ cm}^2$ of wart tissue).

Note: Discontinue after 4 treatment cycles if incomplete response and consider alternative treatment; do not repeat use.

不良反應： 局部刺激、發癢、灼熱。

注意事項： 1.一個週期：連續使用三天後，停藥四天。最多使用四個週期。
2.汰疣凝乳膏對正常皮膚具有傷害性，應避免長期將藥物停留於正常皮膚上。治療期間避免性交(以免交叉感染)。
3.使用前先以肥皂及清水清潔患部並擦乾。
4.塗抹本藥的部位，請不要使用密閉性包紮。

懷孕期： 不建議使用。

授乳期： 不建議使用。尚無足夠資料顯示是否會分泌到乳汁中，無法排除對新生兒或嬰兒的影響。

健保規定： 1.限皮膚、泌尿、婦產專科醫師或經病理診斷確認，使用於生殖器疣(包括外生殖器及肛門附近)之治療。
2.每次限給付乙支(5gm)，一個月內不得重複處方，每次療程間應相隔至少3個月，治療期間不得與其它冷凍、電燒、雷射治療合併申報。
3.若病灶侵犯生殖器部位超過50%，每療程處方之總劑量以10gm為上限，並且需於病歷上詳載，併得合併申報冷凍、電燒或雷射治療。