

Lidocaine

【T1XYA】Lido-anes[®] Spray 10% (1/dose) 10mg/Dose

ATC Code : D04AB01

【TXYA】Lido-anes[®] Spray 10% 10mg/Dose, 50mL/Bot

ATC Code : D04AB01

中文名：立麻卡因噴霧劑 10% 《齊山科技》

適應症：局部麻醉。

主成分：每一噴含有 lidocaine 10mg

用法用量：Note:

- Each activation of the metered dose valve delivers 10 mg lidocaine base. It is unnecessary to dry the site prior to application.
- No more than 20 spray applications should be used in any adult to produce the desired anesthetic effect.
- The number of sprays depend on the extent of the area to be anesthetized.

Administration: for local anesthetic.

Indications and dosage regimens:

Dental practice

1-5 applications to the mucous membranes.

Otorhinolaryngology

3 applications for puncture of the maxillary sinus

During delivery

Up to 20 applications (200 mg lidocaine base).

Introduction of instruments and catheters into the respiratory and digestive tract

Up to 20 applications (200 mg lidocaine base) for procedures in pharynx, larynx, and trachea.

不良反應：局部刺激、喉嚨痛、聲音嘶啞及失聲。

注意事項：

1. 耳鼻喉科：

上頷竇穿刺或其他較小的手術，噴霧 3 次的劑量。

腔液穿放術(paracentesis)：噴霧 3 次的劑量。

2. 生產時：至多噴霧 20 次 (200mg lidocaine 鹽基)。

3. 將器械、管子及導管導入呼吸道或消化道：咽、喉及氣管之處置，至多噴霧 20 次 (200mg 之 lidocaine 鹽基)。在處置延長時，最高可給與 400mg lidocaine。此外，當與其他 lidocaine 產品併用時，總劑量不應超過 400mg。主要用於喉部、氣管及支氣管時，不應噴霧超過 20 次 (200mg 鹽基)。

4. 牙科處置：於黏膜噴霧 1-5 次。

5. 本噴霧劑是用來用於黏膜之上，以有效率的提供大約可持續 10-15 分鐘作用之表面麻醉作用。麻醉作用約在 1-5 分鐘時發生，視使用面積而定。

6. 如需清潔噴嘴，可將整個噴嘴浸於水中煮沸 5 分中(120℃，5 分鐘)。

懷 孕 期：但到目前為止，並無任何與生殖障礙（如：畸形發生率並未增加）有關之報告被發表。

授 乳 期：Lidocaine 可進入母乳，但其劑量極微，通常對新生兒並無危險性。

儲 存：25℃以下陰涼處保存；儲存於 8℃以下時可能會發生沉澱，該沉澱可在室溫下回溫時溶解。

備 註：【TXYA】為自費批價代碼。