

人工血管衛教指導



❖人工血管簡介

人工血管醫師通常會將它裝在右鎖骨或左鎖骨下方的皮膚下面，外表如10元硬幣的注射塑膠圓盤，後面接著導管，而導管會沿著大血管放置於近心臟的位置。多用於長期接受化學治療的病人，可避免化學藥物滲漏及降低血管變硬與反覆扎針的不適。

❖手術後護理

- 1.手術後，醫師會幫您照一張X光，以確定裝置的「人工血管」在正確位置，外觀可見直徑2-3公分皮下圓狀物、3-5公分手術傷口。
- 2.注意是否有傷口疼痛、發紅、腫脹、分泌物或胸悶、胸痛等問題。
- 3.注意人工血管位置是否移動或感覺植入底座有翻轉情形，若有此情形應通知醫師。

❖居家照護

- 1.注意傷口有無紅、腫、熱、痛或分泌物及體溫的變化情形，若有以上情形則表示可能有感染的現象，應立即回到醫院讓醫師察診。
- 2.人工血管做完第7-10日需回門診，由醫護人員評估傷口、拆線，在未拆線前，要每日消毒，於洗澡後用優碘消毒，並保持乾燥。如有血漬應立即消毒並更換紙膠。
- 3.拆線後三日內，於洗澡後用優碘消毒，並保持乾燥，三日後即可正常活動，建議手術側手臂勿過度活動，如提重物、360度旋轉手臂、激烈擴胸運動，以避免人工血管移位。
- 4.當作長期注射、輸注或抽血時，必須以抗凝劑常規沖洗，若暫不使用，每4-6周至醫院沖洗一次，以避免「人工血管」有阻塞、凝血的情形發生。

參考文獻：

杜玲、陳秀勤、劉清華(2015)·癌症病人之護理·於胡月娟總校閱·內外科護理學上冊(5版，223-316頁)·台北市：華杏。

李素貞、陳秀蓉、葉明珍、陳秋慧(2017)·心臟血管系統病人的護理·於林貴滿等編著，內外科護理技術(八版，316-322)·台北市：華杏。