

子宮頸切片、電燒手術衛教指導



❖目的：

從子宮頸外側到子宮頸內腔做圓錐狀的切片，切片所取得的組織用於辨別檢查子宮頸有無細胞異常或是癌症變化之可能。

❖飲食：

按一般正常均衡飲食。

❖疼痛：

可服用醫師開立的止痛劑。

❖陰道排出物：

治療後 1 週內會有水狀液體流出，請保持外陰部乾燥→電燒手術。幾天內會有少量出血，若量多、色鮮紅、必須前來醫院檢查。另外使用棉墊而不用棉條。除非醫師允許否則不可陰道沖洗及盆浴。

❖性生活：

陰道出血完全停止後且下腹部無不適時，等治療療程結束且傷口完全癒合，才可以有性生活。

❖手術部位的照顧：

保持乾燥，按醫囑給予局部藥膏或坐浴使用。

1.陰道內塞有_____塊紗布，請於_____時間自行取出，以避免造成感染。醫師會視情況在陰道內置放一或兩塊紗布，以利加壓止血。

2.若有下列問題，請馬上返院就醫。

(1)大量陰道出血。

(2)發冷或發燒(體溫超過 38°C)。

(3)頻尿或解尿疼痛、解尿燒灼感。

如有其他照護問題，可洽詢(08)7665995 分機 5162

參考文獻：

洪毓謙、程劭儀(2010)·子宮頸抹片異常的處理原則·家庭醫學與基層醫療·25(11)·428-433。
馮容莊、潘怡如(2014)·婦科常見疾病·於李從業總校閱·實用產科護理學(7 版·771-800 頁)·台北：華杏。

黃思誠(2013)·子宮出血：子宮頸癌、子宮內膜癌的預防與治療·中華民國內膜異位癌婦女協會會刊·20(586)·4-5。

