

耳滴製劑給藥衛教指導



為達成藥物劑量正確，建議由家人協助滴藥。

- 一、給藥前請用肥皂、清水將雙手清洗乾淨。
- 二、先使用濕的紙巾清潔耳朵外圍，再將耳朵擦乾。
- 三、將要使用的耳滴劑握在雙手幾分鐘，讓它達到與體溫相當的溫度
- 四、若滴劑原先就是混濁的懸浮液，使用前先充分振搖十秒鐘。
- 五、檢查滴劑的滴嘴是否有破損。
- 六、將藥液吸至滴管，或握住頂蓋滴管的瓶身，並使滴管頭朝下。
- 七、側躺或傾斜將用藥的耳朵朝上。為了讓藥流入耳內，成人要將耳朵往上後方拉，小孩往下後方拉。
- 八、滴管頭避免接觸其他地方而造成污染，保持藥液的清潔。
- 九、依照醫師的醫囑滴正確的藥量入耳朵，然後輕拉耳朵使藥液流入
- 十、保持用藥的耳部傾斜向上數分鐘，或塞入軟棉花至耳朵內，或採用其他藥師、醫師建議的方法，使藥物停留在耳朵內。
- 十一、使用完畢後馬上將滴管或瓶蓋歸回瓶內並將蓋子旋緊。
- 十二、給藥後將雙手洗淨。
- 十三、注意事項：
 - 1、請小心並依照說明使用。
 - 2、勿忘記用藥的時間。
 - 3、將藥物保存在小孩要無法取得之處。
 - 4、若病情持續或更糟，給藥後耳朵痛或有燒灼感，請立刻讓醫師知道。
 - 5、除非特別指示不須冷藏。
 - 6、藥液變色請不再使用。
- 十四、如有疑問請詢問耳鼻喉專科醫師。

參考文獻：

李惠玲(2016)·眼睛與耳朵疾病之護理·於劉雪娥總校閱，內外科護理學下冊(七版，283 頁)·台北市：華杏。

