

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知


注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Dilantin 病人衛教



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

癩能停膠囊 (DILANTIN)

成份 : Phenytoin



100 mg 白&橘色



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用


飲食
注意

1. 控制癲癇或痙攣

2. 周邊神經病變引起的疼痛

EX：偏頭痛、三叉神經痛

3. 治療心律不整



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

穩定神經細胞膜,阻
斷鈉離子通道降低神
經元被激發的機會,
延長不反應期的作用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

請整粒吞服

若忘記服用,請盡快補服 (距離下次>4小時)

不可一次吃兩倍劑量,亦不可擅自停藥

當出現皮膚癢或紅腫等症狀,應立即告訴醫生

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

理想治療濃度

10-20 $\mu\text{g/ml}$



初填劑量

快速達到穩定狀態血中濃度，卻不適宜靜脈注射時，可使用初填劑量



有肝、腎疾病史者不可接受口服初填劑量

最初每隔2小時以400mg，300mg，300mg的劑量分3次給藥(總量1g)，24小時後再開始一般維持劑量，並經常監測血中濃度。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

若造成腸胃不適,可和食物併服



若要進行手術,告訴醫生正服用此藥



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



會降低口服避孕藥的效果



可能會有頭暈或疲倦的情況，
若要開車或操作器具要小心



有牙齦紅腫出血等副作用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



不要服用感冒過敏的成藥



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

監測
濃度

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

請勿飲酒

