

肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項



栓劑病人衛教



肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

無秘栓劑

Bisacodyl Supp



宜痔平栓劑

Posuline Suppository



服樂淨栓劑

Flagyl Suppository



非炎栓劑12.5公絲

Voltron Suppository



肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項



發燒



痔瘡



便秘

肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病


使用
方式

注意
事項

1. 將雙手洗淨，並用乾淨之紙巾將雙手擦乾



2. 將塞劑的外膜撕開



3. 側身躺於床上
將塞劑尖端部份朝前，以食指
將塞劑塞入肛門約 **1-2 指節深**



肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

請將肛門栓劑放置於陰涼乾燥
避免陽光直射，除非特別指示，
否則不需放置於冰箱中



肛門栓劑若軟化，請將栓劑放
置於原包裝內，浸入冷水中
(20度以下)，即可重新朔形

保持躺姿**15分鐘**，避免排出，
確保栓劑於體內完全溶解吸收



u18778331 fotosearch.com

肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

保理寧陰道栓劑

Polinin VAG Supp -90mg



達來陰道錠

Sertaconazole nitrate 500mg



美汝栓劑

Ecovale Suppositories 150 mg



肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項



滴蟲性陰道炎

念珠菌性陰道炎



細菌性陰道炎



肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑

治療
疾病


使用
方式

注意
事項

1. 將雙手洗淨，並用乾淨之紙巾將雙手擦乾



2. 將塞劑的外膜撕開



3. 側身躺於床上
雙腿分開將 劑尖端部份朝前，
以食指將塞劑塞入陰道約 1 - 2
指節深



肛門
栓劑

治療
疾病

使用
方式

注意
事項

陰道
栓劑


治療
疾病

使用
方式

注意
事項

1. 保持陰道的清潔

在用藥之前，應該先把外陰沖洗乾淨，減少細菌，再把栓劑塞進去



2. 用藥期間避免性生活

應該儘量避免性生活，如果實在忍不了的話，最好就戴套進行

3. 最好晚上用藥

栓劑在塞入陰道後會溶解成液體，有少部分吸收不了的會流出體外，最好選擇睡前用藥，避免白天可能出現的尷尬

