アクトス®錠 30「タケダ」
塩酸ピオグリタゾン錠

愛妥糖錠

用藥指導

處方名：Actos
中文名：愛妥糖錠 30mg
適應症：第二型糖尿病
成分：Pioglitazone HCl 30 mg

何謂糖尿病？



出處： http://www.tma.tw/magazine/ShowRepID.asp?rep_id=2330

- 促進周邊組織對胰島素的敏感性。
- 增加骨骼肌攝取葡萄糖的效率。
- 在脂肪組織中可以促進脂肪細胞的分化，減少游離脂肪酸的釋放。
- 減少肝臟製造葡萄糖。

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。

2. 可於飯前或是飯後服用。

3. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服 用的話，可於早晨和傍晚各服用一次！。



- 控制飲食
- 維持理想體重
- 戒菸
- 多運動
- 藥物治療
- 定期檢查

寶建醫療社團法人 寶建醫院 PAOCHIEN HOSPITAL

肝腎功能檢查

避免酒精攝取

定期測血糖值

口服避孕藥

心衰竭病人

抗肺結核用藥

- **本藥與Meformin併用不影響療效。**

寶建醫療社團法人 寶建醫院 PAOCHIEN HOSPITAL

- 多吃蔬菜少吃肉類
- 選擇脂肪量較少的肉類
- 避免動物性脂肪
- 以五穀雜糧為主食
- 少吃甜食、油炸物