

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病



Depakine

帝拔癲腸溶錠 200mg

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病



商品名：**Depakine**
學名：**Valproate acid**
中文名：**帝拔癲腸溶錠**
劑量：**200 mg**

適應症



泛發性與局部癲癇症、兒童抽搐或兒童熱抽搐、行為失常並伴有癲癇症者。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病

何謂癲癇?

認識疾病
癲癇篇2

認識癲癇

健談
havemary.com
圖文創作：健談

癲癇又稱羊癲、羊角癲、羊癲瘋或母豬癲



羊癲瘋
羊癲 羊角癲
母豬癲

大發作時，可能全身抽蓄、痙攣，喪失意識、手腳僵硬、肢體抽筋、牙關緊閉、口吐白沫

持續時間約1~3分鐘，很少超過5分鐘



健談 havemary.com

失神型發作，數秒鐘失神、瞪眼、眼睛張大或眨眼，說話或動作時會突然停止



停止

持續約10~30秒

局部發作，局部的抽蓄或皮膚感覺異常，抽蓄有時是一側肢體或合併頭部

通常病人是清醒的



更多資訊請上 健談



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病

帝拔癲腸溶錠能阻斷GABA transferase 的分解，使腦內GABA 的含量升高，進而抑制神經傳導物質的釋放，降低突觸後神經元的作用。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病



6歲以下兒童：

本藥不適用於六歲以下的孩童，吞食錠劑可能引起窒息的危險。



本品為腸溶錠必須**整粒吞服**，不可剝半、研磨或嚼碎服用。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病

癲癇處理



認識疾病
癲癇篇3

癲癇的處理方法



圖文創作：健談 havemary.com
專家諮詢：禾欣診所 吳書毅醫師

- 1. 營造安全環境：**維持側躺，用衣物保護患者頭部，並移除假牙、眼鏡與危險物品以免受傷



- 2. 維持呼吸道暢通：**勿將物品塞入患者口中，且應鬆開衣領，以維持呼吸道暢通



- 3. 勿制止癲癇患者：**癲癇發作患者處於無意識狀態，毋須壓制病患行為




- 4. 陪伴患者：**應陪伴患者直到恢復意識，或由專業醫護人員接手



癲癇相關問題，建議諮詢
『神經科、家醫科』

更多資訊請上 健談 havemary.com



◆ 本藥應於餐前服用，併服其他藥物請告知醫師。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

預防
疾病

按時服藥，不可自行減藥或停藥。

避免突然的、刺耳的燈光及聲音刺激。

避免發燒，預防感冒或發炎。

劇烈的運動應盡量避免。

日常作息正常，勿喝酒、熬夜、睡眠要充足。

