

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Lendormin

戀多眠錠



用藥指導

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

商品名：Lendormin

中文名：戀多眠錠

劑量：Brotizolam 0.25mg

治療疾病：失眠症的治療。

注意：可能有警覺性及動作協調能力降低、嗜睡、噁心、疲倦、頭痛等不良反應。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

失眠



入睡困難型

上床後超過30分鐘以上無法入睡時

無法熟睡型

一夜睡睡醒醒，一直處於淺眠或睡眠中斷的狀態

清晨早醒型

天還沒有亮就醒來，而且醒來之後就無法再入睡

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Lendormin

對中樞神經系統之
benzodiazepine接受體具
高親和力，可縮短入眠時
間及減少覺醒次數，並增
加睡眠時間。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

- 請依醫生指示使用。
- 應於睡前服用，最好不要在吃飽時服用。

忘記用藥怎麼辦？

1. 儘早把忘記用的藥用了。
2. 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到正常用藥時間。
3. 切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式


注意
事項


交互
作用

飲食
注意

注意事項：

1. 突然停藥會增加戒斷症狀或反彈現象，應採用漸減方式停藥。
2. 不要大量或長期服用本藥。
3. 服用本藥可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。





以上若同時服用用會加強藥理作用。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



避免與茶,咖啡,巧克力,可樂同服