

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Perisdone (Risperidone)

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



Perisdone

中文名：普利思妥膜衣錠

成分：Risperidone 2mg

適應症：思覺失調症之相關症狀，雙極性
疾患之躁症發作

注意：常見副作用有失眠、激躁、焦
慮、頭痛。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知


注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Perisdone

- 思覺失調症之相關症狀
- 雙極性疾患之躁症發作



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

- 主要作用於腦部神經傳導物質多巴胺和血清素受體產生療效。主要治療思覺失調症之相關症狀，雙極性疾患之躁症發作



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知


注意
事項

交互
作用

飲食
注意



▲請遵照醫師指示服用！

- ★空腹或與食物一起服用
- ★勿自行停藥或加藥
- ★忘記吃藥的措施：
 - 當天想起立即補吃
 - 下次服  吃兩倍量

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

均衡飲食，以免過重

服用後不得駕駛或操作機械

避免在陽光下或太熱之處站立太久

可能需要數週才能完全見效。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

以下情形發生...

立即就醫



意識狀況改變

- 譫妄，木然甚至昏迷

肌肉僵直

高體溫

- 可能超過攝氏41度

自律神經功能異常

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Levodopa及其他多巴胺作用劑

- 拮抗Risperidone

Carbamazepine

- 服用劑量需重新評估，必要時須減量。

Phenothiazines、三環抗抑鬱劑 與某些 β -阻斷劑

- 可能提高risperidone之血中濃度

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
須知

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

STOP!

