

藥物 介紹

治療 藥物 使用 注意 交互 定期
疾病 作用 方式 事項 作用 追蹤





藥物 介紹」 治療疾病

藥物 作用

方式 方式

注意┃

作用上追







藥物:Sinemet 25/100

心寧美25/100錠

成分:Levodopa 100mg,

Carbidopa 25mg

適應症:帕金森氏症及綜合病症

(肌肉強直及運動遲緩、震

顫、流涎、吞嚥困難及姿勢

不穩)。



藥物 治療 藥物 使用 注意 交互 定期 介紹 疾病 作用 方式 事項 作用 追蹤

帕金森氏症





藥物 介紹 治療

藥物

使用

注意 疾病。作用。方式。事項。作用

定期

SINEMET治療帕金森氏症 及其徵候群所伴隨的震 顫、吞嚥困難、流涎、 及姿勢不穩皆有助益, 尤其是肌肉僵直及運動 遲緩。

Parkinson's Disease



藥物 | 治療 | 藥物 | 使用 | 注意 | 交互 | 定期 介紹 | 疾病 | 作用 | 方式 | 事項 | 作用 | 追蹤

請勿擅自停用此藥或降低劑量

記錄您的症候

每日相同時間服用此藥

如已接近下一次用藥時間,則跳過錯過的那次用藥

勿一次服用兩倍或額外劑量



藥物 | 治療 | 藥物 | 使用 | 注意 | 交互 | 定期 | 介紹 | 疾病 | 作用 | 方式 | 事項 | 作用 | 追蹤

唾液、尿液或汗液可能呈深色

• 無害,但可能會沾染衣服。

廣角性青光眼患者

• 在治療期間小心監測眼壓。





藥物 | 治療 | 藥物 | 使用 | 注意 | 交互 | 定期 | 介紹 | 疾病 | 作用 | 方式 | 事項 | 作用 | 追蹤

發生開車、吃飯或聊天中睡著現象

若發生此問題或感到極為嗜睡,請立即 聯絡醫師。

服藥後,請勿開車或進行其他需要您提 高警覺性的工作或活動。







藥物 | 治療 | 藥物 | 使用 | 注意 | 交互 | 定期 介紹 | 疾病 | 作用 | 方式 | 事項 | 作用 | 追蹤

降血壓藥物

• 須調整降血壓藥物的劑量。

MAO抑制劑

• 在開始使用SINEMET 前至少兩週即應 停用MAO抑制劑。

使用含鐵藥物或含鐵的多種維生素

• 請詢問醫師或藥師。







藥物 | 治療 | 藥物 | 使用 | 注意 | 交互 | 飲食介紹 | 疾病 | 作用 | 方式 | 事項 | 作用 | 注意

