

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意

Through F.C.
(Sennoside A+ B Calcium)

用藥須知

便通樂膜衣錠

藥物
介紹


治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意



藥物：Through F.C.

便通樂膜衣錠 20mg

成分：Sennoside A+B Calcium 20 mg

適應症：緩解便秘。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

注意
事項

飲食
注意

何謂便秘

便秘是指糞便滯留在腸內過久，
排便間隔時間延長；或糞質乾結，
排出艱難；或雖不延長而排便不
暢、困難等病症。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意

此藥物於胃及小腸並未吸收，而是以原形到達大腸作用部位，經腸內細菌作用後生成代謝產物Rhein anthrone直接刺激大腸壁而促進大腸蠕動，才具有排便、緩下作用。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意

一日一次，於睡前(或空腹時)服用



初次應使用最小劑量，再視通便
情況增減用量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意

- 
- 成人(12歲以上)1次1-2錠
 - 6歲以上未滿12歲，1次1/2-1錠
 - 3歲以上未滿6歲，1次1/4-1/2錠
 - 未滿3歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意



1. 為防止兒童誤食請妥善保管。



2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。



3. 孕婦及授乳婦不建議自行使用。



4. 勿超過建議劑量。



5. 瀉劑不應長期使用。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

飲食
注意



儘量以含纖維飲食，
充分攝取水分及運
動來改善便秘。