

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Glucobay

醣祿錠

用藥指導



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



商品：Glucobay 醣祿錠
成分：Acarbose
適應症：非胰島素依賴型糖
尿病之治療



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

定期
追蹤

糖尿病有哪些型？

第一型糖尿病

免疫系統把製造胰島素的 β 細胞，當成外來物質攻擊，影響胰島素的分泌，好發於幼童與青少年。



第二型糖尿病

體內細胞對胰島素產生阻抗，胰島素無法引導葡萄糖進入細胞，好發於40歲以上中老年人。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

定期
追蹤

糖尿病有哪些型？

妊娠糖尿病

發生於女性懷孕期間，
後可能會消失，但必須
定期檢查血糖。



其他類型糖尿病

因胰臟疾病、內分泌疾病、
或藥物等引響胰島素分泌，
極少數患者屬於此型。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用


使用
方式

生活
改善


交互
作用

定期
追蹤

認識第二型糖尿病



受器被堵住後，血液中樸旁旁無法進入組織被利用，導致血液中糖分上升。



奔身基因有些缺陷，脂肪容易囤積在細胞表層。



細胞表層的脂肪會堵住胰島素受器。



血糖濃度無法下降，胰臟會不段分泌胰島素，最後導致胰臟過勞。

胰臟過勞後無法分泌胰島素，血糖更難控制，進入惡性循環。

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

定期
追蹤

糖尿病的症狀

體重
在短時間
內大幅減
輕或增加

減輕



疲勞、虛弱
、失去食慾
(類似流感
的感覺)



吃多、喝多
、尿多



暴躁易怒



視力模糊或複視



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

Acarbose是一種治療第二型糖尿病的藥物，屬於「**葡萄糖苷酶抑制劑**」，可與其它抗糖尿病藥物一起合用以治療較嚴重糖尿病

食物中的糖類或澱粉在身體內甘經由「**葡萄糖苷酶**」的作用分解為葡萄糖然後被吸收到體內以增加血糖的含量並作為身體所需能量的來源。

藥理作用是能夠抑制**小腸-葡萄糖苷酶**的作用，因此能夠將食物轉化為葡萄糖的過程減慢並使血糖上昇速度緩慢，因此有降低及平穩飯後血糖的作用



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

須在**用餐前**整顆吞服，或
用餐時與前數口食物一起
咬碎吞下。



本藥可能有脹氣，腹瀉、腹
痛，皮膚、眼睛變黃等不良
反應。



療效及耐受性因人而異。
劑量應由醫師作調整請遵照指
示用藥，未經醫師指示不可自
行調整劑量或增加服藥次數。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

如果我忘記（錯過）一次用藥，該怎麼辦？

- ①假如距離服藥時間剛過不久，請在想起時立即服用。
- ②如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次，下次的用藥時間在服用。
- ③切勿一次服用兩倍或額外劑量。



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意



服用本劑，腸內氣體的形成會增多；若有重度疝氣、腸阻塞、腸潰瘍者的病情，應停藥。

孕婦以及受乳婦人不建議服用，請
在用藥前告知醫師

本藥單獨使用應不會造成低
血糖，但若併用磺胺類降血糖
藥或胰島素，則可能發生低血糖。



血清氨基轉移酵素可能會升高。
建議在治療的第一年每三個月檢
查一次肝酵素，之後定期檢查。

告知醫師是否對本藥物過敏
，以及是否有服用其他藥



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

注意
事項

交互
作用

飲食
注意

會增強本藥的降血糖作用，可能須調降本藥的劑量。 例如：



大蒜
人參

Neomycin

磺胺類藥物

會降低本藥的作用，所以不應同時使用。 例如：

腸吸附劑

分解醣類的
消化酵素



藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

飲食
注意

糖尿病飲食原則



五穀根莖類



肉、魚、蛋、豆類



奶類

均勻攝取六大類食物

醣類食物(五穀根莖水果)不宜過多



蔬菜類



水果類



油脂類

藥物
介紹

治療
疾病

藥物
作用

使用
方式

生活
改善

交互
作用

飲食
注意

糖尿病飲食原則



避免食用精緻糖類、油炸類食物或人工奶油製品



避免攝取過多糖分，視需要酌量使用代糖。盡量選擇高纖低脂清淡食物

