

豬尾巴導管引流衛教指導

- 一、目的:移除身體內的氣體或液體，適用於肋膜積水、氣胸、血胸、膿胸以及體腔開刀手術後。依照部位放置引流管。



二、預防管路滑脫

- 1、臥床時，注意引流管路避免糾結、壓迫或垂下繞圈，以免影響引流的功能，更改姿勢時，請動作輕緩防止管路之牽扯或脫出。
- 2、若不慎脫出或斷裂，請立即通知醫護人員處理。
- 3、下床活動時，注意管路是否已適當固定，引流瓶(袋)切勿高於腰部，以免引流液逆流造成感染。
- 4、若是無法配合管路留置(意識不清、躁動)，必要時提供保護性手拍及約束帶，預防管路拔除。
- 5、插管後若您有呼吸困難、呼吸更喘、更費力或疼痛等情形請立即告知醫護人員，視情況予止痛劑使用，緩解您的不適。
- 6、活動及運動:在護理人員教導下，鼓勵做深呼吸及咳嗽，以利肺部擴張及胸管引流通暢。
- 7、翻身、下床活動時要小心，不要牽扯或壓到管子，造成管路阻塞或滑出。
- 8、觀察病人有無持續高燒 ($> 38^{\circ}\text{C}$) 之情況。

9、護理人員會每班檢視傷口敷料情形及引流量。

10、如有下列情況請通知醫護人員：

(1)豬尾巴導管與引流瓶(袋)之接合處鬆脫。

(2)引流瓶(袋)傾斜或引流液倒出。

(3)引流瓶(袋)破損。

(4)引流管若有移位或脫落，應立刻用無菌敷料蓋上，不要嘗試重新插入，並立刻找醫護人員處理。

(5)當敷料潮濕時請通知護理人員，須立即更換，避免造成傷口感染。

(6)引流導管出口有任何發炎症狀，如發紅、腫、發熱、膿狀分泌物或疼痛，請通知護理人員。

11、其他注意事項

★勿弄濕敷料，身體清潔暫時以擦澡方式。

參考文獻：

彭佳玲、莊莉苓、李珮琪、張淑芳 (2013)·降低胸腔 Pig-tail 引流管路滑脫率改善方案·*榮
總護理*，30(1)，10-17。doi:10.6142/VGHN.30.1.10

