



鼻部術後 衛教指導

❖ 定義

鼻腔的功能是過濾雜質並溼潤及溫暖空氣，接受嗅覺的刺激及當作說話時聲音的共鳴箱。

❖ 病因

常見的疾病為慢性鼻竇炎、慢性肥厚性鼻炎、過敏性鼻炎、鼻息肉、鼻中隔彎曲...等，一般症狀為容易鼻塞、鼻涕倒流或打噴嚏。經藥物治療未見改善時，醫師會建議以手術治療。

❖ 手術前注意事項

1. 填寫手術同意書、手術說明書及麻醉同意書。
2. 手術前一天晚上12點以後禁食任何飲食(包括水)。
3. 手術當天需更換手術衣褲，及脫掉內衣褲，並注射點滴。
4. 需去除所有金屬物品如：項鍊、手錶、假牙、戒指、舌環、隱形眼鏡、指甲油…。

❖ 手術後常見之情況

1. 鼻出血：傷口如針孔大小，較不會出血，但如有短暫鼻出血，一般只要休息冰敷即可，如有出血量較多的情形應立即通知醫護人員或速回醫院止血。
2. 鼻塞：術後 2-3 天內會有鼻塞情形，3-4 天腫脹及開始消退，至第一次返診後，清除鼻內分泌物或凝結血塊後即可改善。
3. 鼻內分泌物增加：術後傷口腫脹，分泌物 3 天內會增加，一般於一週內即減少。
4. 暫時性嗅覺異常：短期效應，因為術後暫時性傷口腫脹，影響嗅味顆粒與鼻腔內嗅覺神經接觸，傷口腫脹消失後即會恢復。
5. 感染：手術部位發炎，會有膿性鼻涕。

❖ 手術後注意事項

1. 手術後請採半坐臥姿，以減輕鼻部腫脹及促進引流
2. 於 24 小時內鼻上需冰敷，每次約 20 分鐘，休息 20 分鐘，以預防

出血及減輕腫痛。

3. 術後會有少量血水從鼻部滲出，屬正常現象，請勿用力擤鼻涕或挖鼻孔，鼻塞現象約一個月後可恢復正常。
4. 鼻部手術後為了止血，鼻部會塞滿止血棉，為預防鼻內填塞物滑出，請勿擤鼻子、打噴嚏、咳嗽，請改用張口呼吸。
5. 止血棉填塞期間，鼻部及臉頰會有腫脹不適感，雙眼偶有流眼淚、眼眶紅及輕微頭痛等現象皆屬正常，待鼻內止血棉取出後，會日漸改善。
6. 若出現眼眶周圍瘀青、腫脹、視力模糊情形或有鮮血從鼻孔滲出或流入喉嚨，請立即告知醫護人員。
7. 請勿自行取出鼻內止血棉，如不慎滑出或滑入時，請立即通知醫護人員處理。
8. 手術後當天為避免活動而出血，應盡量抬高床頭臥床休息。

❖ 飲食

1. 全身麻醉之患者術後需禁食 6 小時，因麻醉插管之緣故，可能會有喉嚨痛、吞嚥不適情形，可增加水分攝取，1-2 天後症狀會慢慢減輕。
2. 手術後當天：
 - (1) 吃軟質易咀嚼的食物：稀飯、麵食、蒸蛋、魚肉。
 - (2) 禁止菸、酒、辛辣物、咖啡、油炸物、熱食的食物。
 - (3) 可多吃高蛋白（魚、肉、蛋及豆類）、高維生素的食物（深色蔬菜、水果）。
3. 術後勿進補及使用任何含酒精食物，亦勿食用熱食及熱飲預防出血。
4. 因張口呼吸，易造成口及嘴唇乾燥，需多攝取水份
5. 進食後需漱口及刷牙，保持口腔清潔，以防止細菌滋長。

❖ 出院後照護

1. 術後約 2-3 星期因鼻內傷口結痂，仍會有鼻塞情形，返診時醫師會為您清除，請勿自行挖鼻子、用力擤鼻涕，以防傷口出血或感染。
2. 避免抽菸、喝酒，影響鼻腔血管收縮導致出血。
3. 減少出入公共場所，避免上呼吸道感染，必要時戴口罩。

4. 請勿曬太陽、避免劇烈運動及泡熱水澡，以免鼻部出血。
5. 術後2週內，為避免鼻內傷口出血或感染，請勿：
 - (1) 運動或過度勞動，例如：打籃球、跑跳。
 - (2) 用力的動作，例如：提重物、用力解便。
 - (3) 水上活動，例如：游泳、潛水。
6. 若有持續出血或發燒情形，請盡速返院就醫。

參考文獻：

蔡麗絲(2011)眼耳鼻喉疾病病人之護理，於胡月娟總校閱. 內外科護理學下冊(1050-1064頁)。台北:華杏。



寶建醫療
社團法人 **寶建醫院** 關心您
PAOCHIEN HOSPITAL

總機：08-7665995

院址：屏東市中山路123號

救護專線：08-7330290

網址：www.paochien.com.tw