

# 寶建藥品快訊

## 第 10905-03 期要目

新藥通知：※109/03/19 藥事管理委員會議決同意進用藥品

Cefotin 2 g/Vial

k-Glu Oral Solution 20 mEq/15 mL/Vial

Minirin® Nasal Spray 10 ug/Dose, 2.5 mL/Vial

【內文共 15 頁】

### 【新藥通知】

#### 1、Cefotin 2 g/Vial (菌伏定乾粉注射劑)

【意欣】

主 成 分：Cefoxitin (ATC Code: J01DC01)

類 別：Cephamycins 80:12.07.12

適 應 症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其它  
有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：-Usual dosage:

• Adults:

I.M.,I.V.:1-2g every 6-8 hours(maximum dose:12g/day)

• Infants>3 months and Children:

I.M.,I.V.:80-160mg/kg/day in divided doses every 4-6 hours  
(maximum dose:12g/day)

-Recommended dosage in renal impairment:

Clcr(mL/min)	Dosage
30-50	1-2g every 8-12 hr.
10-29	1-2g every 12-24 hr.
5-9	0.5-1g every 12-24 hr.
<5	0.5-1g every 24-48 hr.

※Hemodialysis: Moderately dialyzable; administer a loading dose of 1-2g after each hemodialysis.

不良反應：肌肉注射可能會感到疼痛、靜脈注射有時會引起血栓靜脈炎、過敏反應、噁心、嘔吐、腹瀉。

- 注意事項：
1. 肌肉注射—每公克Cefoxitin以2 mL注射用水或0.5%，1% Lidocaine HC1（不含 epinephrine）注射液溶解後作深部肌肉注射。
  2. 直接靜脈注射—每公克Cefoxitin溶於10mL注射用水，以3至5分鐘速度慢慢注射於靜脈內。
  3. 靜脈滴注—將本品1~2gm溶於50~100mL之5%，10%葡萄糖液，或0.9%生理鹽水，或其他可相容之靜脈輸液，以頭皮針或蝶狀針注射。變換姿勢(如:起床)要緩慢以免跌倒。
  4. 含有MTT支鏈，使用時要常規監測PT，肝衰竭與正在出血的病患，不可使用。
  5. 配製後溶液儘快使用，室溫可保存6小時，冷藏可保存7天。

用藥分級：本品依 FDA 孕婦用藥分級列為 B 級。

進用原由：109/03/19藥事管理委員會議決同意進用。

藥品外觀：注射劑。

處方名：**Cefotin Inj 2 g (Cefoxitin)**

電腦代碼：**ICEFO**

健保代碼：AC37442212

健保單價：168 元/瓶

品項代碼(料號)：**1I0A037442**



## 2、k-Glu Oral Solution 20 mEq/15 mL/Vial (鉀補口服液)

【信東】

主成分：Potassium Gluconate (ATC Code: A12BA05)

類別：Replacement Preparations 40:12

適應症：鉀缺乏症。

用法用量：**Prevention of hypokalemia during diuretic therapy:**

- Adult, 20-80 mEq/day in 3-4 divided doses.
- Child, 1-2 mEq/kg/day in 1-2 divided doses.

**Treatment of hypokalemia:**

- Adult, 40-100 mEq/day in 2-4 divided doses.
- Child, 2-5 mEq/kg/day in 2-4 divided doses.

不良反應：噁心、胃痙攣、嘔吐。

注意事項：1、不得用於注射。

2、與開水或果汁混合後服用，飯後服用

3、本藥不得與會滯留鉀離子之利尿劑併用。

4、本藥不建議使用於孕婦及授乳婦。

5、不正常的血中鉀離子濃度過高(特別常發生於腎臟疾病之病人)，則會有意識混亂、血壓降低、心律不整等情形。

用藥分級：本品依FDA孕婦用藥分級列為 A 級。

進用原由：109/03/19藥事管理委員會議決同意進用。

藥品外觀：液劑

處方名：**液劑 K-Glu Oral Solution**

電腦代碼：**OGLK**

健保代碼：AC58956135

健保單價：14.9 元/瓶

品項代碼(料號)：**100A058956**

相似藥品：



處方名： <b>Radi-k® 595mg/Tab</b> <b>(2.54 mEq/Tab)</b> <b>(Potassium Gluconate)</b> 電腦代碼： <b>ORAD</b>	處方名： <b>液劑 K-Glu Oral Solution</b> <b>(20 mEq/15 mL/Vial)</b> <b>(Potassium Gluconate)</b> 電腦代碼： <b>OGLK</b>

## 3、Minirin® Nasal Spray 10 mcg/Dose, 2.5 mL/Vial (迷你寧鼻腔噴霧劑) 【Ferring】

主成分：Desmopressin Acetate (ATC Code: H01BA02)

類別：Pituitart 68:28

適應症：中樞尿崩症、腎功能試驗。

用法用量：**Central diabetes Insipidus:**

-Intranasal: Usual dose range: 10 to 40 mcg daily (0.1 to 0.4 mL) as a single dose or divided 2 to 3 times daily; adjust morning and evening doses separately for an adequate diurnal rhythm of water turnover. Most adults require 10 mcg (0.1 mL) twice daily.

-Children ≥4 years and Adolescents: Initial: 10 mcg once daily

into 1 nostril, may titrate dose up to 30 mcg/day in 1 to 2 divided doses; if administered twice



daily, adjust morning and evening doses separately to provide for an adequate diurnal rhythm of urine output.

不良反應：頭痛、腹痛、噁心、水分滯留或低血鈉、鼻出血、鼻炎等。

注意事項：1、第一次開瓶時先按壓 4 次或至藥液可以噴出，若有數日至一星期未使用時應比照前述步驟處理。

2、使用前先將鼻腔內清除乾淨。取下瓶蓋，以單手或雙手握住藥瓶。

3、用藥時，若醫師處方劑量為「一噴」，指僅需噴單側鼻孔一次即可，切勿雙側都噴。若處方劑量為「兩噴」，則可雙側各噴一下。噴藥時必須屏氣。頭部後仰可維持 3 ~ 5 分鐘讓藥品吸收。

4、噴用完 15 分鐘內，避免擤鼻子。

5、每次使用完畢後，將噴頭擦拭乾淨，蓋上瓶蓋並保持直立。鼻腔噴霧劑快用完時，請先確認管子是否浸泡於藥液中，若無，則將瓶身稍微傾斜，使之浸泡於藥液中使用。

用藥分級：本品依FDA孕婦用藥分級列為 B 級。

進用原由：109/03/19藥事管理委員會議決同意進用。

藥品外觀：鼻腔噴霧劑。

處方名：**鼻腔 Minirin Nasal Spray 10 mcg/Dose**

電腦代碼：**TMIN**

健保代碼：BC21874414 健保單價：1785 元/瓶

品項代碼(料號)：**1T0B021874**