

寶建藥品快訊

第 10905-07 期要目

新藥通知：※109/03/19 藥事管理委員會議決同意進用藥品

Brosym® 2 g/Vial

換廠通知: Digosin 0.25 mg/Tab

Trazone 50 mg/Tab

【內文共 3 頁】

【新藥通知】

1、Brosym 2 g/Vial (博益欣注射劑)

【臺灣東洋】

主成分：Each vial contains：(ATC Code:J01DD62)

Cefoperazone Sodium...1000 mg

Salbactam Sodium.....1000 mg

類別：Third Generation Cephalosporins 08:12.06.12

適應症：用於治療由感受性細菌所引起的下列感染：上、下呼吸道感染、上、下泌尿道感染、腹膜炎、膽囊炎、膽管炎及其他腹腔內感染、骨盆發炎、子宮內膜炎及其他生殖道感染、以及創傷燙傷、手術後之二次感染。

用法用量：Intermittent by IV infusion over 3 minutes.

Infectious disease of abdomen, neutropenia associated with infectious disease, postoperative wound infection, urinary tract infectious disease：

-Adult:

Mild-to-moderate infections:0.5g/0.5g~ 1 g/1g Q12h.

Severe infections may be treated with a maximum of 2 g/2g Q12 h.

Patients with both hepatic and renal dysfunction will likely require a dosage reduction.

-Children:

Mild-to-moderate infections: 20mg/20mg/kg/day ~40 mg/40mg/kg/day in 2-4 divided doses；

Serious infections: 80mg/80 mg/kg/day in 2-4divided doses.

Renal Impairment:

| Clcr(mL/min) | Cefoperazone/Salbactam Max Dose |
|--------------|---------------------------------|
| 30 | 4g/4g (2g/2g Q12h) |
| 15-29 | 2g/2g (1g/1g Q12h) |
| ≤ 15 | 1g/1g (500mg/500mg Q12h) |

不良反應：腹瀉、發燒、發疹。

注意事項：1、只限靜脈注射，不可皮下及肌肉注射。

2、本品可使用靜脈注射或靜脈輸液給藥，靜脈注射應緩慢，注射時間應不少於3分鐘。

3、配置方法：直接以Brosym藥瓶配製溶液，每瓶加入適量稀釋液(1g 或2g，使用約6-10 mL)，充分振搖至溶解為止。若使用靜脈輸液給藥，請於充分溶解後加入可配伍之靜脈輸注稀釋液使用。

4、可配伍之靜脈輸注稀釋液：D5W, NS

5、配製後之溶液應立即使用。未使用部分，若置於室溫可保存6小時，存放在冰箱內應在48小時內使用。

6、cefoperazone因具有NMTT支鏈(N-methylthiotetrazole side chain)，而



抑制維他命K環氧化物還原酵素 (vitamin K epoxide reductase)，進而影響凝血因子的功能，因此在這類病人使用時，應事先給予補充維他命K，以預防嚴重的出血。

用藥分級：本品依FDA孕婦用藥分級列為B級。

進用原由：109/03/19藥事管理委員會議決同意進用。

藥品外觀：注射劑

處方名：**2g Brosym**

電腦代碼：**IBRO2**

健保代碼：AC58156212

健保單價：439 元/瓶

品項代碼 (料號)：**1I3A058156**

【換廠通知】

1、Digosin 0.25 mg/Tab

【 CJ Healthcare 】

主成分：Digoxin

處方名：**Digosin (Digoxin)**

電腦代碼：**O8062**

備註：1、依廠商說明，本品項因製造廠產能問題，導致延遲供應，廠商(安沛國際有限公司)原宣稱將於預計於109年3月及7月到貨，後又因航班問題無法進貨，實際可供貨日期與數量未定。

2、衛福部委託韋淳公司，進口 **Digosin 0.25 mg/Tab** 供醫療使用。

3、截至 109/05/15 08:00 止，全院庫存 **400** 粒。(平均月用量：500 粒)

4、新、原外觀比較參見下表。

新品項

原品項

Digosin (Digoxin)

院用處方名：Digosin (Digoxin)

廠牌：CJ Healthcare

批價代碼：O8062



白色，圓形錠；錠劑一面有十字剝痕，另一面有 DG 字樣。(大小：7mm)。

Lanoxin 0.25 mg/Tab

院用處方名：Digoxin(Lanoxin)

廠牌：Aspen

批價代碼：ODIG



白色，圓形雙凸錠，剝痕面有 D025 字樣。(直徑 7mm)

2、Trazone 50 mg/Tab (暢鬱舒錠)

【 信東生技 】

主成分：Trazodone HCl

處方名：**Trazone Tab 50mg (Trazodone)**

電腦代碼：**OTRAZ**

備註：1、原院內品項美時製品 **Mesyrel 50 mg/Tab**，因供應問題改由信東製品 **Trazone 50 mg/Tab** 取代。

2、新、原外觀比較參見下表。

新品項

原品項

Trazone 50 mg/Tab

院用處方名：Trazone Tab 50mg

(Trazodone)


廠牌：信東生技

Mesyrel 50 mg/Tab

院用處方名：Mesyrel

廠牌：美時

批價代碼：OTRAZ



批價代碼：OMES



粉紅色，圓形錠；錠劑有一剝痕。(大小:8mm) 膚色，圓形錠；有一剝痕，無剝痕面有 LO 字樣。