

寶建藥品快訊

第 10905-10 期要目

新藥通知：※109/03/19 藥事管理委員會會議決同意進用藥品

Conslife Tab

Efient 3.75 mg/Tab

Fusidic Acid Cream 15 g/Tube

【內文共 2 頁】

【新藥通知】

1、Conslife Tab (秘福糖衣錠)

【永信】

主成分：Each Tablet contains: (ATC Code:A06AB20)

Diocetyl Sodium Sulfosuccinate...20mg

Bisacodyl...2mg

Sennoside...10mg

類別：Cathartics and Laxatives 56:12

適應症：便秘及緩和便秘所伴生之下列諸症狀：腹部膨滿、腸內異常發酵、食慾不振。

用法用量：Adults：2-3 Tab HS

Children(6-12 yr)：2 Tab HS

不良反應：腹痛、腹部絞痛、過敏、結腸粘膜變黑、腹瀉、噁心、嘔吐。

注意事項：1、本藥禁用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。

2、若有血便及自發性直腸出血狀況，或服用一週無效後應停藥立即就醫。

3、會誘發子宮收縮而有流、早產之危險性。故對孕婦及可能懷孕之婦女，宜避免大量投與。

4、本藥須整粒吞服，不得咬碎，且服藥前後一小時不得使用制酸劑或牛乳。

5、本藥會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色。

6、本藥長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。

用藥分級：本品依FDA孕婦用藥分級列為 未知。

進用原由：109/03/19 藥事管理委員會會議決同意進用。

藥品外觀：淺青色，圓凸形錠劑。


處方名：複方 Conslife Tab

電腦代碼：OCONS

健保代碼：AC323721G0

健保單價：2 元/粒

品項代碼(料號)：100A032372



2、Efient 3.75 mg/Tab (抑凝安膜衣錠)

【台灣第一三共】

主成分：Prasugrel HCl (ATC Code: B01AC22)

類別：Platelet-Aggregation Inhibitors 20:12.18

適應症：適用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的急性冠狀動脈症候群(ACS；不穩定型心絞痛[UA]、非 ST 段上升之心肌梗塞[NSTEMI]或 ST 段上升之心肌梗塞[STEMI])。

藥性簡述：Prasugrel is a prodrug. It is converted to its active metabolite, which inhibits platelet aggregation by binding to the P2Y₁₂ ADP receptors on platelets selectively and irreversibly.

用法用量：Acute coronary syndrome (ACS):

-initiated with a single 20 mg oral dose and then continued at a 3.75 mg once daily oral dose as a maintenance dose.

Safety and efficacy not established in children < 18 yr.



不良反應：出血相關反應(如鼻出血、牙齦出血等)、皮疹。

注意事項：1、不建議於空腹情況下使用 Efient。

2、請留意起始劑量和 aspirin 併用時，可能會增加出血的風險。

3、Efient 所引發的血小板凝集抑制作用，可能會對要接受手術的病患造成問題，建議臨床醫師在術前至少 14 天停止使用 Efient。

4、體重偏低的病患[體重偏低的病患其出血風險可能較高。體重≤50 kg 的病患，血栓事件風險和其他出血風險因子(如年齡和腎功能)應加以評估。]

用藥分級：本品依FDA孕婦用藥分級列為**B** 級。

進用原由：109/03/19藥事管理委員會議決**同意進用**。

藥品外觀：白色微紅，橢圓形錠；錠劑上有3.75 字樣。(大小:7 X 5 mm)

處方名：**Efient Tab 3.75 mg (Prasugrel)**

電腦代碼：**OEF3**

健保代碼：BC27361100

健保單價：38.5 元/粒

品項代碼(料號)：**100B027361**

健保規定：限用於需要冠狀動脈介入性治療(PCI)的已發作之急性冠心症(包括不穩定型心絞痛、非 ST 段上升型心肌梗塞或 ST 段上升型心肌梗塞)而住院的病人時，得與 acetylsalicylic acid (如 Aspirin) 合併治療，最長 12 個月。需於病歷註明住院時間。

3、Fusidic Acid Cream 15 g/Tube (褐黴素乳膏)

【杏輝】

主成分：Each g contains : (ATC Code: D06AX01)

Fusidic Acid...20 mg

類別：Antibacterials 84:04. 04

適應症：葡萄球菌、鏈球菌或其他對 Fusidic Acid 敏感的細菌的皮膚感染症。

用法用量：**Children and Adult:**

Apply small amount to affected area 2 to 3 times daily for 7 to 14 days. If a gauze dressing is used, frequency of application may be reduced to once or twice daily.

不良反應：皮膚發紅、腫脹、發疹。

注意事項：僅供局部使用；請勿靠近眼睛使用。

用藥分級：本品依FDA孕婦用藥分級列為 **C** 級。

進用原由：109/03/19藥事管理委員會議決**同意進用**。

藥品外觀：乳膏劑。

處方名：**Fusidic Acid Cream**

電腦代碼：**TFUS**

健保代碼：AC49339335

健保單價：137 元/條

品項代碼(料號)：**1T0A049339**



藥劑科

109/05/22