



如何使用 Fleet® (佛利特護舒達口服液®)

➤ 醫師為何開立 Fleet®?

緩解偶發性便秘、手術前、X光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

➤ 懷孕或哺乳時該怎麼辦?


若您準備懷孕、已懷孕或哺乳時，使用前先詢問您的醫師或藥師。

➤ 要如何服用?

壹、 醫療程序前之清腸

☐ 上午檢查

1. 檢查前一日下午 2 點，將一瓶 Fleet® 加入 360cc 的無渣冷飲（如沙士、可樂、運動飲料）或水稀釋後飲下。



2. 檢查前一日晚上 7 點，再將一瓶 Fleet® 依照上述方式服用。

☐ 下午檢查


1. 檢查前一日晚上 7 點，將一瓶 Fleet® 加入 360cc 的無渣冷飲（如沙士、可樂、運動飲料）或水稀釋後飲下。
2. 檢查當日早上 6 點或至少離檢查前 3 小時，再將一瓶 Fleet® 依照上述方式服用。

貳、 緩瀉劑使用

1. 將一瓶 Fleet® 加入 360cc 的無渣冷飲（如沙士、可樂、運動飲料）或水稀釋後飲下。



- 服藥 30~60 分鐘內開始產生排泄作用，作用持續 6~8 小時，請儘可能多喝水（約 1000cc~1500cc），以減少脫水症狀。



► 當服用此藥時，應該注意什麼？

- 限鈉飲食、腸胃道阻塞、潰瘍、結腸炎、具結腸症、肝硬化合併腹水或有任何醫療狀況，請先告知您的醫師。
- 心臟或腎臟疾病、五歲以下小孩，請勿使用此藥。
- 使用此藥後，如果出現直腸出血、服藥後六小時腸未蠕動或出現脫水症狀（如嘔吐、眩暈、尿量比平常少），請停止用藥並詢問您的醫師。
- 若您有噁心、嘔吐、腹瀉、排便習慣改變持續超過二週、服用其他瀉劑治療便秘超過一週、正在服用其他處方或非處方用藥，請先詢問您的醫師。
- 糖尿病患者建議於檢查當天早上服用一杯糖水或無渣果汁，並暫時不服用降血糖藥物。

用藥諮詢電話：08-7665995 （分機）1351

此衛教單張未包含所有的藥品資訊，若您有其他相關問題，請諮詢您的醫師或藥師！