

## 孕婦用藥安全

# An toàn khi dùng thuốc cho bà bầu

### Cấp độ an toàn khi dùng thuốc cho bà bầu

Bà bầu cần tránh những thuốc không cần thiết, cố gắng sử dụng điều trị bằng thức ăn hoặc thay đổi thói quen sinh hoạt.

Cấp A: Đối chiếu lâm sàng cho thấy là an toàn cho bà bầu

Cấp B: Không có đối chiếu xét nghiệm lâm sàng, xét nghiệm ở động vật cho thấy là an toàn và không có phản ứng xấu, đối chiếu lâm sàng không có vấn đề gì

Cấp C: Xét nghiệm động vật cho thấy có dị tính, nhưng không có xét nghiệm đối chiếu ở người hoặc thiếu thông tin xét nghiệm lâm sàng

Cấp D: Có dị tính, nhưng có thể sử dụng trong điều trị (lợi nhiều hơn hại)

Cấp X: Bà bầu tuyệt đối không được sử dụng

### Nhân tố quyết định việc bà bầu uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi

1. Đặc tính gây quái thai của thuốc, thuốc có kết hợp với Protein không, phương thức chuyển hóa thuốc
2. Thời gian dùng thuốc ở thời kỳ mang thai nào
3. Thời gian và liều lượng dùng thuốc
4. Phương thức uống thuốc
5. Tình hình chảy máu tử cung của người mẹ
6. Khả năng chuyển hóa cơ thể người mẹ, mức độ mỡ cơ thể

### Ảnh hưởng của dược liệu đối với thai

Theo tình hình phát triển của thai có thể chia:

|                       |                        |  |
|-----------------------|------------------------|--|
| Thời kỳ tiền lâm sàng | 0-2 tuần               | Thông thường không dẫn tới dị dạng thai nhi  |
| Thời kỳ phôi thai     | 3-8 tuần               | Thời kỳ then chốt, thời kỳ hình thành cơ quan, dẫn tới thai nhi dị dạng hoặc chết lưu  |
| Thời kỳ thai nhi      | 9-16 tuần              | Có thể dẫn tới hở lợi hoặc cơ quan sinh dục thai nhi nữ trở thành nam                  |
| Thời kỳ thai nhi      | 16 tuần đến trước sinh | Thai nhi sinh trưởng hoàn toàn, có thể dẫn tới chức năng sinh lý thai nhi bị dị thường |