

輸精管結紮及傷口照護衛教指導



❖輸精管結紮注意事項：

1. 欲行結紮手術之患者，需取得夫妻雙方同意。
2. 夫妻雙方需簽署手術同意書及需麻醉者需填妥麻醉同意書。
3. 此項手術為自費手術，健保並不給付。
4. 行輸精管結紮，男性約等到三個月後或射精 15 次後方能達到避孕效果（因精子成熟時間約為 75 天）。
5. 結紮後避孕率高達 99.9%，僅有少數患者會自行接通（0.1%）。

❖傷口照護注意事項：

1. 飲食：照一般飲食習慣，無特殊禁忌。
2. 疼痛：手術後 1~2 天局部傷口會有疼痛現象，可用止痛藥減輕(如醫師開的藥物)。
3. 保持局部乾燥，不可弄濕，若不慎弄濕或弄髒；請立即以水性優碘溶液自行消毒後蓋上消毒紗布或就近醫療院所換藥。
4. 若有需要換藥者請持換藥卡至一樓櫃台批價後再至二樓門診換藥室(有門診時間皆可換藥)。
 - (1)手術後第三天請回門診追蹤(無預約回診者)。
 - (2)有需拆線者，視傷口癒合情形大約 7~10 天拆線。
5. 若有下列徵象，請馬上就醫：
 - (1)傷口紅腫熱痛、發燒不適。
 - (2)傷口有膿液流出。
 - (3)縫線斷裂。

如有其他問題，可洽詢(08)7665995 分機 5162 或泌尿科門診分機 2220

文獻資料：

謝振興(2016)·輸精管結紮手術，取自 <https://www.urokingdom.com>

