

## 兒童靜脈注射照護原則衛教指導



1. 打上靜脈留置針時，針頭插入部位仍會有疼痛感，大約 10~20 分鐘後，疼痛會較減輕。
2. 維持點滴順暢，勿壓迫、扭曲或拉扯點滴管。
3. 下床活動時，點滴需高於注射部位約 90 公分，以維持壓力避免血液回流而阻塞。
4. 若注射部位周圍皮膚有發紅、蒼白、冰冷、腫脹、疼痛、點滴外漏、點滴不順暢或不滴、血液逆流或膠布鬆脫、或無故哭鬧不休等情形，請立即通知護理人員處理。
5. 任何活動時，切記勿讓孩童拉扯點滴，以免造成滑脫。
6. 孩童乘坐娃娃車或輪椅時，需注意注射管路有無纏住輪子。
7. 勿自行調整滴數，以免影響藥物作用或造成心肺不適。
8. 若點滴滴空，請勿自行關閉管夾或自行拔除，以免血液凝固在針頭處或造成導管阻塞，可立即請護理人員處理。
9. 注射點滴期間可以用擦澡方式清潔身體，如因淋浴或更換衣服時可請護理人員協助。
10. 若有任何關於點滴注射之問題請詢問護理人員。

### 參考文獻：

- 陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉等(2018)·住院兒童之反應及其護理·於陳月枝總校閱，*實用兒科護理*(八版，226-229 頁)·台北市：華杏。
- 溫玉燕、陳郁琪、李翠萍(2013)，降低某兒科病房非預期性靜脈注射重注率，*馬偕護理雜誌*，7(1)，41-51。