

Mepivacaine

【I1ESPEA】 Mepivastesin Injection Solution 1.7mL/Syringe *ATC Code : N01BB03*

中文名：美力威士得新注射劑 « 3M »

適應症：牙科用麻醉劑。

藥理分類：Local Anesthetic.

用法用量：主要成分：每一 mL 含
Mepivacaine -----30mg

用法：使用於口腔黏膜

用量：

1. ≥ 15 years old children and adults: 1~4 mL
MAX: 4mg Mepivacaine /kg
2. <15 years old Children:
20~30kg: 0.25~1 mL
30~45kg: 0.5~2mL
MAX: 4mg Mepivacaine /kg
3. Injection rate: < 0.5mL/15seconds

不良反應：心動過緩。口唇麻木或刺痛感。金屬口味。頭暈或昏厥。

交互作用：併用抗凝血劑會增加出血風險。

注意事項：1.不可靜脈給藥，避免血管內直接注射。
2.使用後若發生暈眩，不宜駕駛或操作機械。
3.經啟封的卡筒不能用於另一患者。

懷孕期：本品會通過胎盤進入胎兒體內，只有當無其他可替代之局部麻醉劑時才給予懷孕之婦女。

哺乳期：無相關資料。建議於接受本藥 24 小時之後才哺乳。