白喉/百日咳/破傷風/小兒麻痺/b 型流行感冒嗜血桿菌

【I25IN11】公費第 1 劑 Infanrix-IPV+Hib[®] 0.5mL/vial ATC Code : J07CA06

【I25IN12】公費第 2 劑 Infanrix-IPV+Hib[®] 0.5mL/vial ATC Code : J07CA06

【I25IN13】公費第 3 劑 Infanrix-IPV+Hib[®] 0.5mL/vial ATC Code : J07CA06

【I25IN14】公費第 4 劑 Infanrix-IPV+Hib[®] 0.5mL/vial ATC Code : J07CA06

中文名：公費第 1~4 劑五合一疫苗(5in1-1) «GSK»

適應症：

- 針對 2 個月以上之嬰幼兒白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺與 b 型流行性感冒嗜血桿菌之主動免疫。
- 先前已接種過白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺及 Hib 抗原疫苗的兒童，亦可使用 InfanrixIPV+Hib 作為追加劑。

用法用量：Administration:

- 以**深部肌肉注射**方式接種。最好注射在大腿的前外側。每劑最好注射在不同的位置。
- 對患有血小板減少症或出血性疾病的患者施打 Infanrix-IPV+Hib 時應小心，因為這類患者在肌肉注射之後可能會發生出血的現象。注射後應緊壓(不要搓揉)注射部位至少兩分鐘。

Recommended immunization schedule:

基礎接種：由兩個月大開始，在六個月大之前接種三劑；每次接種應間隔至少一個月。

追加接種：於出生後的第二年追加一劑，但與基礎疫苗接種完成的時間應間隔至少 6 個月。

不良反應：煩躁不安、易怒、異常哭鬧。嗜睡、嘔吐、發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 。注射部位反應（疼痛、紅疹、腫脹）等。

注意事項：

- 1、Infanrix-IPV+Hib 不建議用於成人、青少年或五歲以上的兒童。
- 2、在任何情況下都不可以靜脈注射的方式投予 Infanrix-IPV+Hib。
- 3、現行的小兒疫苗接種原則是同時接種不同的疫苗，Infanrix-IPV+Hib 可與 B 型肝炎疫苗同時接種。與另一種不同的注射用疫苗同時接種時，應注射在不同的部位。
- 4、疫苗經過配製後應立即使用。
- 5、由於 Infanrix-IPV 懸浮液在貯存期間可能會形成白色沉澱，因此在使用前應充分搖勻。

懷孕期：無資料。Infanrix-IPV+Hib 並非供成人使用。

授乳期：無資料。Infanrix-IPV+Hib 並非供成人使用。

儲存：儲存於冰箱（ 2°C - 8°C ）。不可冷凍。

備註：公費品項。