

Empagliflozin, Metformin

【OJARI】 Jardiance Duo® 12.5 mg/850 mg Tab

ATC Code : A10BD20

中文名： 恩美糖膜衣錠 « Boehringer »

主成分： Each tablet contain:
Empagliflozin.....12.5mg
Metformin.....850mg

適應症： 第二型糖尿病。

藥理分類： Antidiabetic, Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitor; Biguanide.

用法用量： Administration: Orally, taken with meals.

Dosage regimen:

Diabetes mellitus, type 2:

1 Tab BID

Renal Impairment:

eGFR <30 mL/minute/1.73 m²: Use is contraindicated.

Max daily dose: empagliflozin-- 25 mg , metformin-- 2000 mg.

Safety and efficacy not established in children<18 yr.

不良反應：腹瀉，頭痛，尿道感染，生殖器感染等。

交互作用：

- Beta blockers: hypoglycemia or hyperglycemia; decreased symptoms of hypoglycemia
- Fluoroquinolones: ↑ risk of hypoglycemia or hyperglycemia.
- Hydroxychloroquine: hypoglycemia.
- Iodinated contrast media: result in lactic acidosis and acute renal failure.
- ACE inhibitors, aspirin: ↑ risk of hypoglycemia.

注意事項：1. eGFR < 30 mL/minute/1.73 m² 禁用。

2.隨餐服用。

3.有膀胱癌病史者，請先告訴醫師。

4.本藥會增加生殖泌尿道感染風險，應注意衛生。

5.服藥期間若發生尿液混濁、頻尿、尿道疼痛灼熱感、血尿或呼吸困難、尿量少、下肢水腫等，須儘速回診。

懷孕期： 1.不建議在懷孕第二孕期和第三孕期時使用 Jardiance Duo®。

2. Insulin is the preferred medication for treating hyperglycemia in gestational diabetes mellitus. Metformin and glyburide should not be used as first-line agents, as both cross the placenta to the fetus. Other oral and noninsulin injectable glucose-lowering medications lack long-term safety data. (ADA 2020).

授乳期： 因為可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應(empagliflozin 可能影響出生後的腎臟發育)，不建議在哺乳期間使用。