

Live, attenuated, recombinant Japanese encephalitis virus

【I2JE1】 Imojev[®] 0.5mL/Syringe

ATC Code : J07BA02

【I2JE2】 Imojev[®] 0.5mL/Syringe

ATC Code : J07BA02

【I2JE3】 Imojev[®] 0.5mL/Syringe

ATC Code : J07BA02

中文名： 巴斯德細胞型日本腦炎活性減毒疫苗 «衛生所，賽諾菲»

適應症： 預防日本腦炎病毒所引起的日本腦炎，接種者的年齡應等於或大於9個月。

藥物性質： 活性減毒基因重組疫苗。經配製後為無色至琥珀色之懸浮液。

用法用量： **Administration:**

- 應以皮下注射方式接種。
- 若接種者的年齡 ≥ 2 歲，建議之注射部位為上臂外側。
- 若接種者的年齡介於9-24個月，則建議之注射部位為大腿的前外側。
- 不可以靜脈注射方式接種。
- 不得與任何其他注射性疫苗或藥物混合。

Dosage regimen:

基礎接種：

年齡等於或大於9個月者：注射一劑0.5毫升之配製疫苗。

追加接種：

- 兒童：(18歲以內)若需達到長期保護效果，基礎接種之後應追加注射一劑 Imojev[®]。追加接種的時間點最好在基礎接種之後12個月，最長可延至基礎接種之後24個月。
- Imojev[®]追加接種亦適用於先前以不活化日本腦炎疫苗進行基礎接種的兒童，對於第一劑與第二劑使用不活化日本腦炎疫苗的兒童，可於第二劑後約一年接種本品。

不良反應： 頭痛、疲倦、全身無力及肌肉痠痛。注射部位疼痛。腹瀉、噁心、腹痛、嘔吐。流鼻水、咳嗽、哮喘、鼻塞。皮疹。

注意事項：

- 1、**配製**：利用包裝盒內附的注射器及其中一支針頭，將0.4%氯化鈉溶液全部抽出，然後注入含有凍晶疫苗的玻璃小瓶，以配製 Imojev[®]疫苗。**輕輕旋轉**玻璃小瓶。當凍晶粉末完全溶解後，使用同一支注射器抽出0.5毫升劑量的重組後懸浮液。接著，將注射器換上包裝盒內附的第2支針頭，然後再進行注射。
- 2、成人可以同時接種 Imojev[®]與黃熱病疫苗。
- 3、12個月以上的兒童，可與麻疹、腮腺炎或德國麻疹疫苗(個別疫苗或混合疫苗)同時接種。
- 4、當其他疫苗與 Imojev[®]同時接種時，應注射於**不同部位**並使用**不同的注射器**。
- 5、若患者接受高劑量的全身性皮質類固醇治療14天或以上，則建議在治療中斷後，應**間隔至少1個月或以上**，直到免疫功能恢復後才能接種疫苗。

懷孕期： 如同所有的活性減毒疫苗一樣，**懷孕婦女禁止接種**。

授乳期： 授乳婦女**禁止接種** Imojev[®]疫苗。尚不清楚本疫苗是否會分泌至人類乳汁中。

- 儲存：
1. 冷藏 2-8[°]C，避光儲存。切勿冷凍。
 2. 配製後，玻璃小瓶中的任何剩餘疫苗應在6小時之內使用。在這段期間，疫苗應避光存放在2~8[°]C(例如冰箱)。不可冷凍。