## **Paclitaxel**

[17040] Abraxane® for Inj Suspension 100mg/Vial ATC Code: L01CD01

中文名: 亞伯杉注射劑 《賽基有限公司》

適應症: 轉移性乳癌。非小細胞肺癌。轉移性胰腺癌。

藥理分類: Antineoplastic Agent, Antimicrotubular; Taxane Derivative.

用法用量: 轉移性乳癌:

對於轉移性乳癌以合併化療失敗,每3週一次,以30分鐘靜脈射 $260 mg/m^2$ 。 **非小細胞肺癌:** 

每 21 天療程的第  $1 \cdot 8 \cdot 15$  天,以 30 分鐘靜脈輸注  $100 \text{ mg/m}^2 \cdot \text{Carboplatin}$  僅在每 21 天療程的第 1 天施用 Abraxane®之後立即開始。 說明:在 Abraxane®用於非小細胞肺癌之臨床試驗中,Carboplatin 之目標劑量為每次 AUC =  $6 \text{ mg} \cdot \text{min/mL} \cdot$ 

## 胰腺癌:

Abraxane<sup>®</sup>之建議劑量為每 28 天療程的第  $1 \times 8 \times 15$  天,以 30-40 分鐘靜脈輸注  $125 \text{ mg/m}^2 \circ \text{Gemcitabine}$  之建議劑量為  $1000 \text{ mg/m}^2 \circ \text{Abraxane}$  在每 28 天療程的第  $1 \times 8 \times 15$  天,施用 Abraxane<sup>®</sup>之後立即開始以 30-40 分鐘靜脈輸注。

不良反應: 嗜中性白血球缺乏症、血小板缺乏、貧血、過敏反應、體液滯留、皮膚反應、 感覺異常、禿頭、肝指數異常、注射部位反應。噁心、嘔吐、腹瀉。

注意事項:

- 1. Neutrophil 數目小於 1500 個/mm<sup>3</sup>、懷孕及授乳婦禁用此藥。
- 2. 外滲時處理:冷敷或熱敷。
- 3. 本品為 Paclitaxel 結合白蛋白之劑型,其藥物功能性質可能與溶液劑型有 大幅差異。請勿交替使用不同 Paclitaxel 劑型。

懷 孕 期: 1.懷孕女性使用 Paclitaxel 可能會導致胎兒傷害。

2.目前尚未針對懷孕女性進行試驗。應指示具有懷孕能力的女性在 Paclitaxel 治療期間避免懷孕。如果在懷孕期間使用 Paclitaxel,或患者在接受該藥物治療時懷孕,應評估患者的潛在危險。

授 乳 期: 考慮用藥對母體的重要性,決定停止哺乳或停止用藥。還不清楚 Paclitaxel 是 否會分泌至人類乳汁中。

配 製: 以20mL NS 溶解後(5mg/mL),以針筒抽取所需劑量,移至空輸液袋。

安定性: 調製後之溶液可冷藏24小時,在室溫下可儲存4小時。

储 存: 藥瓶應置於原包裝紙盒,避免強光照射,存放在30°C下。