Eribulin

[I7032] Halaven ® 1mg/2mL/Vial ATC Code : L01XX41

中文名: 賀樂維 0.5 毫克/毫升注射液 《衛采製藥》

適應症: 轉移性乳癌、脂肪肉瘤。

藥理分類: Antineoplastic Agent, Antimicrotubular

用法用量: Administration: Adult

IV: Infuse over 2 to 5 minutes. May be administered undiluted or diluted. Do not administer other medications through the same IV line, or through a line containing dextrose.

Indications and dosage regimens:

Breast cancer, metastatic: IV

1.4 mg/m² on days 1 and 8 of a 21-day treatment cycle until disease progression or unacceptable toxicity.

Liposarcoma, unresectable or metastatic: IV:

1.4 mg/m² on days 1 and 8 of a 21-day treatment cycle until disease progression or unacceptable toxicity.

Dosing in renal impairment:

● 中度至重度腎功能不全病人(肌酸酐清除率 15-49 mL/min): 1.1mg/m²,於 第1天和第8天靜脈注射2至5分鐘給藥,每21天為一週期。

Dosing in hepatic impairment:

- 輕度肝功能不全病人(Child-Pugh A): 1.1 mg/m²,於第1天和第8天靜脈注射2至5分鐘給藥,每21天為一週期。
- 中度肝功能不全病人(Child-Pugh B): 0.7 mg/m², 於第1天和第8天靜脈注射2至5分鐘給藥,每21天為一週期。

不良反應: 血液毒性、周邊神經病變、無力疲勞、掉髮、胃腸不適、體重減輕、肝功能指 數上升、關節肌肉疼痛、頭痛、發燒。

注意事項: 不可以葡萄糖溶液稀釋或使用含葡萄糖溶液之靜脈注射管線。

懷 孕 期: 1.須採有效之避孕方法:女性患者用藥期間及最後一劑2周內、男性患者用藥期間及最後一劑3.5個月。

2. Based on the mechanism of action, and data from animal reproduction studies, in utero exposure to eribulin may cause fetal harm.

授 乳 期: 1.使用本藥期間及最後一劑後2周內不建議哺乳。

2. It is not known if eribulin is present in breast milk.

Due to the potential for serious adverse reactions, breastfeeding is not recommended during eribulin treatment and for 2 weeks after the last dose.

配 製: 1) 自單次使用之小瓶中抽取所需劑量之 Halaven®。

2) 可不稀釋或以 100 mL 0.9% 氯化鈉溶液稀釋。

相容輸注液: 0.9%氯化鈉注射液。禁止使用含 dextrose 溶液。

安定性: 稀釋後之 Halaven[®]溶液於**室溫下最長可放置 4 小時**,於冷藏最長可放置 **24 小時**。未使用完之小瓶須丟棄。