

Meningococcal Group B Vaccine

【IBEX】自費 Bexsero® Meningococcal Vaccine 0.5mL/Syringe

ATC Code : J07AH09

中文名：必思諾 B 型腦膜炎雙球菌疫苗 «GSK»

適應症：適用於 2 個月以上兒童及成人之主動免疫接種，以預防 B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌所引起的侵入性腦膜炎雙球菌疾病。

成分：1 劑(0.5 毫升)含有：

重組 B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌 Neisserial Heparin Binding Antigen(NHBA)融合蛋白1,2,3 ---50 微克

重組 B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌 Neisserial adhesin A (NadA)蛋白1,2,3 ---50 微克

重組 B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌 factor H binding protein (fHbp)融合蛋白1,2,3 ---50 微克

B 型奈瑟氏腦膜炎雙球菌 NZ98/254 株外膜囊 Outer Membrane Vesicles(OMV)，計量標準為含有 PorA P1.4 之蛋白質的總量 25 微克

藥理分類：Vaccine, Inactivated (Bacterial).

用法用量：Administration: For **IM administration only**, preferably into the upper deltoid region.

Do not administer via IV, SubQ, or intradermal route. Do not mix with other vaccines or injections.

Dosage regimens:

第一劑的施打年齡	基礎免疫接種	施打基礎劑的間隔時間	追加劑
嬰兒， 2至5個月大 ^a	2劑，每劑 0.5毫升	不少於2個月	是，應於第12到15個月大時施打一劑，且基礎系列與追加劑之間應間隔至少6個月 ^{b,c}
	3劑，每劑 0.5毫升	不少於1個月	
嬰兒， 6至11個月大	2劑，每劑 0.5毫升	不少於2個月	是，應於出生後第二年施打一劑，且基礎系列與追加劑之間應間隔至少2個月 ^b
兒童， 12至23個月大	2劑，每劑 0.5毫升	不少於2個月	是，應施打一劑，且基礎系列與追加劑之間應間隔12至23個月 ^b
兒童， 2至10歲	2劑，每劑 0.5毫升	不少於1個月	依據官方的建議，有暴露於腦膜炎雙球菌疾病之持續風險的人應考慮施打一劑追加劑 ^b
青少年(11歲以上)與成人*			

^a Bexsero用於未滿8週大之嬰兒的安全性與預防效果尚未確立。目前並無任何相關資料。

^b 參見「臨床試驗資料」。

^c 追加劑施打不應晚於24個月大之後。

* Bexsero用於65歲以上之成人之安全性與預防效果尚未確立。

不良反應：飲食失調、嗜睡、異常啼哭、頭痛、腹瀉、嘔吐、皮疹、關節痛、發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)、注射部位反應(觸痛、發紅、腫脹)、頭痛、噁心。

注意事項：

1. 本疫苗應以深部肌肉注射的方式給藥，最好注射在嬰兒的大腿前外側或年紀較大者的上臂三角肌區域。切勿以靜脈注射、皮下注射、或皮內注射方式施打。若同時施打多種疫苗，應施打於不同的注射部位。不可與其他疫苗混合於同一個注射針筒內。
2. Bexsero 可與下列任何疫苗抗原併用，不論是單價疫苗還是複合疫苗：白喉、破傷風、無細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌、非活性小兒麻痺、B 型肝炎、7 價肺炎鏈球菌接合型疫苗、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、水痘與 A、C、W、Y 型腦膜炎雙球菌接合型疫苗。與其他疫苗同時施打時，應將 Bexsero 注射在不同的注射部位。
3. 懸浮液在存放期間可能會形成細微的灰白色沉澱物。使用此疫苗前請充分振

搖，使形成均勻的懸浮液。

4. 患有急性嚴重發燒性疾病的病人，應延後接種 Bexsero。

5. 如發現本劑有外來異物或異樣時，則該疫苗不可使用。

懷 孕 期： 目前並無足夠孕婦接種本疫苗的臨床資料。目前並不確知孕婦的潛在風險。不過，當有明確的暴露於腦膜炎雙球菌感染的風險時，即不應停止接種疫苗。

授 乳 期： 目前並沒有疫苗對哺乳期間之婦女及其幼兒之安全性方面的資料。在決定於哺乳期間施打疫苗之前，應先評估效益風險比率。

儲 存： 請存放於冰箱中(2°C-8°C)。切勿冷凍。請避免光線照射。在高至 25°C 之溫度下最長達 48 小時仍可維持品質穩定。

備 註： 本品為自費品項。