

Ferric Hydroxide Sucrose Complex (Iron Sucrose)

【IFEBA】Fe-Back[®] 2% 100mg Fe(III)/5mL/Vial

ATC Code : B03AC

中文名：鐵補注射液 «南光»

適應症：急、慢性失血、貧血、手術後鐵質缺乏症。

成分： Each ml contains:

Ferric-Hydroxide-Sucrose complex(蔗糖鐵) 400 mg
(eq. to Trivalent iron20.mg)

藥理分類： **Iron Salt.**

用法用量： Slow IV injection > 2 min, 40-200 mg/day in 2 divided doses. Dosages depend on the Fe requirement of the patient.

不良反應： 低血壓、腿抽筋 (leg cramp)、腹瀉、噁心、嘔吐及頭痛，其他嚴重副作用包括過敏、呼吸困難及癲癇發作。

注意事項： 1. Fe-Back[®] 2%應緩慢靜脈注射(< 20mg/min)或靜脈滴注。單次注射勿超過 200mg。
2. 洗腎患者可於透析時，經由透析管靜脈端緩慢注射(< 20mg/min)，單次注射勿超過 200mg。
3. 對本藥品過敏、嚴重肝功能不良者與非缺鐵性貧血者皆禁用。
4. 嚴重腎功能不良者(會導致腎功能惡化)及發作性夜間血尿者(有誘發溶血之可能)皆需小心使用。

懷 孕 期： 1. 於明確需要時才可於懷孕時使用本品。
2. 動物試驗未發現對胎兒有危害。

授 乳 期： 尚未知是否分泌至人類乳汁，哺乳婦使用 Fe-Back[®]應小心。

安 定 性： 1. 稀釋後，室溫 24 小時內使用，注射過程可不需避光。
2. 藥物若發現沉澱，請勿使用。

儲 存： 於 25°C 陰涼處，不可冷藏。

相容輸注液： NS。