

Doripenem Hydrate

【IFINI】 Finibax[®] 0.25g/Vial

ATC Code : J01DH04

中文名：伏霸注射劑 «鹽野義»

適應症：對 Doripenem Hydrate 具感受性之菌種的複雜性泌尿道感染（包括腎盂腎炎）及複雜性腹腔內感染。

藥理分類：Antibiotic, Carbapenem.

用法用量：Administration: IV infusion over 60 minutes.

Indications and Dosage regimens: Adults with normal renal function:

—Urinary tract infections (Complicated) or Pyelonephritis:

IV 500 mg Q8h for 10-14 days.

—Intra-abdominal infections, Complicated, Severe:

IV 500 mg Q8h for 5-14 days.

Dosage for Adults with Renal Impairment:

Clcr(mL/min)	Daily Dosage
>50	No adjustment necessary
≥ 30 ~ ≤ 50	250mg Q8h
>10 ~ <30	250mg Q12h

Safety and effectiveness not established in pediatric patients.

不良反應：頭痛、噁心、腹瀉、發疹、靜脈炎。

注意事項：1.不可將 Finibax[®]與其它藥品混合或同時輸注。
2.須以滅菌注射用水或 NS 作為配製懸浮液的稀釋液。

懷 孕 期：1.動物試驗結果並未發現有致畸胎性，而且該試驗對胚胎的骨化過程、發育延遲或體重皆無影響。
2.由於目前對孕婦尚無充分的報告，且動物試驗並不能完全推估至人體，故本藥用於孕婦前，應先經審慎考量。

授 乳 期：1.It is not known if doripenem is excreted into breast milk.
2.Caution be exercised when administering doripenem to nursing women.

配製與安定性：1.以 10mL 滅菌注射用水或 NS 配製成懸浮液，此懸浮液不能直接注射。
請在 1 小時內抽取注入 NS 或 D5W 注射液袋。
2.以 NS 稀釋安定時間為室溫 12 小時。以 D5W 稀釋安定時間為室溫 4 小時。
於 2~8°C 冰箱中可保存 24 小時。
3.注射液可為澄清無色到澄清微黃色溶液。

相容輸注液：D5W、NS

給付規定：健保藥品給付規定：

- 1、經細菌培養證實有意義之致病菌且對其他抗生素均具抗藥性或對其他具有感受性抗生素過敏，而對 carbapenem 具有感受性之複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)及複雜性腹腔內感染。
- 2、臨床上為嚴重之複雜性泌尿道感染(包括腎盂腎炎)及複雜性腹腔內感染，且經其他廣效性非第一線抗生素治療仍無法控制病情者。
- 3、經感染科醫師會診確認有感染症需使用者(申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料)。