

Flomoxef Sodium

【IFLUM2】Flomoxef 1g/Vial

ATC Code : J01DC 14

中文名：富莫莎乾粉靜脈注射劑 《中國化學製藥》

適應症：對本劑有感受性之下列病原菌引起之嚴重感染：葡萄球菌屬、鏈球菌屬(腸球菌除外)、肺炎球菌、Peptostreptococcus 屬、Branhamella catarrhalis、淋菌、大腸菌、Klebsiella 屬、Proteus 屬、Influenzae 菌、Bacteroides 屬。

藥理分類：Antibiotic, Cephalosporin.

用法用量：Administration: IV or IV infusion.

Dosage regimens :

Adults: 1-2 g/day in 2 divided doses, up to 4 g/day in 2-4 divided doses.

Children:

60-80 mg/kg/day in 3-4 divided doses; up to 150 mg/kg/day if severe infection.

※Flomoxef 對於腎臟機能障礙患者之劑量調整(鹽野義公司提供資料)：

Flomoxef 幾乎不代謝，以原型經腎臟由尿液排出，使用上相當安全，但腎臟機能障礙之患者仍須根據下列表格調整投與之劑量，若需洗腎，則建議在病患洗腎前後各投與 1 g 之 Flomoxef 即可。

Table 1. Dosage regimens in Patients with Renal Insufficiency

Serum creatinine (mg/dL)	Creatinine clearance (mL/min)	Dosage (g/day)
< 1.4	> 80	4
1.4-1.8	80-50	3
1.8-3.1	50-25	2
3.1-75	25-5	1
> 7	< 5	0.5

From: Infection 19(1991) suppl. 5 p.S297

Table 2.

Clcr (mL/min)	投與間隔 (小時)	一次投與量 (一般量相對百分比)
60-80	8-12	70 %
40-60	8-12	50 %
20-40	8-12	40 %
< 20	24	20 %

From: FMN-D-2p.26

不良反應：血球數目異常、休克、過敏、肝腎障礙、維他命 K、B 缺乏、下痢、軟便。

注意事項：1.若對 penicillin 過敏的患者，使用 cephalosporin 類藥品應特別小心。
2.含 N-methylthiotetrazole (NMTT) 支鏈者，會干擾凝血因子的合成，可能導致病人有出血傾向，如 cefmetazole、cefoperazone、latamoxef、flomoxef。

交互作用：1.與 furosemide 並用時，有增強腎毒性之虞，請慎重投予。
2.與 probenecid 並用時，會增加 Flomoxef 血中濃度，請小心監測病患反應。

懷 孕 期：安全性尚未確立。

授 乳 期：安全性尚未確立。

配 製：以 4 mL 以上的注射用水、D5W 或 NS 加入 vial 中，充分振盪，使完全溶解。

安 定 性：配製後溶液應儘速使用，室溫可保持 6 小時或冷藏 24 小時以內。

相容輸注液：D5W 或 NS。