

## Choriogonadotropin Alfa

【IOVI】自費 Ovidrel<sup>®</sup> 250mcg/0.5mL/syringe ATC Code : G03GA08

中文名：克得諾注射液 250 微克 «Merck»

適應症：1.實施人工生殖協助技術(ART)。2.無排卵或排卵過少婦女的誘導排卵。

藥理分類：**Gonadotropin; Ovulation Stimulator.**

用法用量：用法：Ovidrel<sup>®</sup>以皮下注射使用，注射部位須更換。

用量：

— 實施人工生殖協助技術(ART)，如體外受精(IVF)的超誘導排卵：  
當投與最後一劑的 FSH 或 hMG 製劑 24 至 48 小時後，即當濾泡經刺激成長達適當時機時，投與一劑 250mcg Ovidrel<sup>®</sup>。

— 無排卵或排卵過少婦女的誘導排卵：  
當濾泡經刺激成長達適當時機 24 至 48 小時後，投與一劑 250mcg Ovidrel<sup>®</sup>。建議病人在使用 Ovidrel<sup>®</sup>當天及隔天進行性交。

不良反應：注射部位疼痛、頭痛、疲倦、OHSS、噁心、嘔吐、腹痛。

注意事項：1. Ovidrel<sup>®</sup>以皮下注射方式投與且僅能單次使用。  
2. 應告知病人，使用 Ovidrel<sup>®</sup>後 10 天內可能會在血清或尿液中測出 hCG，造成假性懷孕的結果。  
3. (1)注射部位--肚子，大腿正面。(2)先以酒精棉球消毒注射部位，捏緊皮膚，針頭以 45°-90°角像射標槍一樣注射於皮膚下。不可直接注射到血管。注射時慢慢推針筒，直到注射完所有藥液，注射完後立刻拔出針頭 並以酒精棉球繞環狀以清潔注射部位。

懷孕期：懷孕期間不適用 Ovidrel<sup>®</sup>。臨床研究並未有此類使用於懷孕婦女的報告，亦無進行 hCG 對於動物生殖影響的研究。對於人類的潛在風險仍未知。

哺乳期：授乳期間不適用 Ovidrel<sup>®</sup>。無有關 hCG 分泌至母乳中的資料。

保存：※置於原包裝中，貯存於 2~8°C 中。在藥品有效期內，可置於 25°C 以下 30 天。但 30 天後若未使用，則應將藥品丟棄。

※包裝打開後要立即使用，若未立即使用，在 2~8°C 下不能超過 24 小時。