

Ascorbic Acid

【IPANN】(自費) Pannobel® Injection 5000mg/20mL/Amp

ATC Code : A11GA01

主 成 分 : Each mL contains:

Ascorbic Acid.....250mg

中 文 名 : 諾貝爾注射液 «南光化學»

適 應 症 : 壞血症、齒齦出血、維他命C缺乏症

藥理分類: **Vitamin, Water Soluble**

用法用量:

Administration:

- For IV infusion, IM, IV or SubQ.
- For intravenous injection, dilution into a large volume parenteral such as Normal Saline or Glucose is recommended to minimize the adverse reactions associated with intravenous injection.
- Avoid rapid IV injection; may cause temporary faintness or dizziness.
- **IV infusion:** Following dilution in an 250mL appropriate IV solution (eg, D5W, NS), administer by slow IV infusion (30~45 minutes).

Dosage regimens:

	預防	治療
未成熟兒		75~100mg/day
嬰兒	30mg/day	100~300mg/day
兒童、成人	70~150mg/day	300~1000mg/day

- ◆ 必要時可用到上表所列劑量的 3~5 倍。
- ◆ 燒傷症狀：1~2 g/日。
- ◆ 成人每日最大劑量：6 g。
- ◆ 所需劑量可一次或分次給予。

不良反應：高草酸尿(大劑量時)、腹瀉(大劑量時)、注射部位疼痛。

注意事項：

- 草酸結石病人需小心使用。
- Glucose-6-phosphatase dehydrogenase 缺乏之病人需小心使用。
- 靜脈輸注時，應先以相容之輸注液 250mL 稀釋，稀釋後，滴注 30~45 分鐘。(廠商資料)

懷 孕 期：

1. Animal reproduction studies have not been conducted.
2. Some pregnant women (eg, smokers) may require supplementation greater than the RDA (IOM 2000).

授 乳 期：

Ascorbic acid is present in breast milk; regulatory mechanisms prevent concentrations from exceeding a required amount (IOM 2000)

儲 存：陰涼處避光存放。