

Peramivir Hydrate

【IRAP】Rapiacta® for Intravenous Drip Infusion 300 mg/60 mL/Bag

ATC Code : J05AH03

中文名：瑞貝塔點滴靜脈注射液 «塩野義»

適應症：治療成人及一個月大以上兒童之 A 型及 B 型流感病毒急性感染。

藥理分類：Antiviral Agent; Neuraminidase Inhibitor.

用法用量：Administrations: IV infusion over 15 min.

Indications and dosage regimens:

Treatment of Influenza A or B Virus infections:

Adults:

300 mg QD.

Maximum dose: 600mg/dose.

Renal Impairment:

Clcr(mL/min)	Daily Dosage
$50 \leq \text{Clcr}$	300 mg
$30 \leq \text{Clcr} \leq 50$	100 mg
$10 \leq \text{Clcr} \leq 30$	50 mg

Pediatric:

Influenza, treatment; acute, uncomplicated:

Note: Administer within 2 days of onset of symptoms of influenza.

Infants ≥ 6 months and Children:

IV: 12 mg/kg as a single dose; maximum dose: 600 mg/dose.

Adolescents: IV: 600 mg as a single dose.

(仿單)

兒童建議劑量為 10 mg/kg，每次最多不得超過 600 mg，15 分鐘以上單次點滴靜脈注射。

不良反應：腹瀉、噁心、嗜中性球低下、精神症狀（ex:幻覺、譫妄）、過敏等。

注意事項：1.宜於流感症狀發現後 48 小時內給藥。
2.單次投予，以 15 分鐘以上靜脈輸注給藥。
3.連續投與之經驗有限。
4.血液透析病患請於透析後投與。
5.治療早期（如給藥隔天）可能會出現肝功能不良、黃疸等現象；在開始投與後應隨即進行肝功能檢查，並充分觀察病患的狀況。

懷 孕 期：對於孕婦或可能懷孕之婦女，在判斷其於治療上的有益性高於危險性時才可投與。懷孕期投與本藥之相關安全性尚未確立。

授 乳 期：使用本藥期間應避免哺餵母乳。大鼠動物試驗中有藥物分布至母乳的報告。